

بررسی رفتارهای باروری بهورزان متأهل شهرستان بابل (۱۳۷۵)

آرام تیرگر^۱، محمود حاجی احمدی^۱

۱- عضو هیأت علمی گروه پزشکی اجتماعی

سابقه و هدف: سهم بزرگی از برنامه‌های مربوط به تنظیم خانواده در مناطق روستایی به عهده بهورزان می‌باشد. بنابراین به منظور ارزیابی عملکرد خود بهورزان در زمینه تنظیم خانواده به بررسی رفتارهای باروری کلیه بهورزان متأهل شهرستان بابل پرداخته شد.

مواد و روشها: جهت اینکار پرسشنامه‌ای توسط پژوهشگر تهیه و توسط ۱۷۱ بهورز متأهل تکمیل شد و داده‌های مربوطه نهایتاً با استفاده از تست آماری Chi - square و آزمون آنالیز شدند و در صورتی که ارزش p از ۰/۰۵ کمتر بوده تفاوتها معنی‌دار تلقی شدند.

یافته‌ها: نتایج بدست آمده از این بررسی نشان می‌دهد که میانگین سنی بهورزان ۲۰/۰۱ سال (بهورزان مرد ۲۲/۰۱ و بهورزان زن ۲۸/۶۶ سال) و میانگین تعداد اولاد آنها ۲/۰۲ نفر بوده که بهورزان زن با برخورداری از میانگین تعداد اولاد کمتر (۱/۷ نفر) نسبت به بهورزان مرد (همسر بهورزان مرد) (۲/۷ نفر)، الگوی مناسبتری از رفتارهای باروری را نشان داده‌اند ($p < ۰/۰۰۵$). ضمناً بهورزان زن با برخورداری از میانگین سن ازدواج کمتر ($p < ۰/۰۰۱$) نسبت به همسر، میانگین اولین حاملگی بالاتر ($p < ۰/۰۰۱$) همچنین میانگین فاصله مولید و فاصله دو حاملگی آخر طولانی‌تر ($p < ۰/۰۲۵$) از رفتارهای باروری بهتری برخوردار بوده‌اند که البته انجام آزمونهای آماری بجز یک مورد (میانگین فاصله مولید) بیانگر اختلاف معنی‌داری بین دو گروه یادشده می‌باشد. بررسی بر روی روشهای تنظیم خانواده نشان داد که تنها ۵۷/۴ درصد از بهورزان از روشهای مطمئن پیشگیری از بارداری استفاده نموده و ۲۸/۴ درصد از آنها از روشهای غیرمطمئن استفاده می‌کنند. ضمناً ۱۴/۲ درصد از بهورزان به دلایل مختلف چون نازایی، حاملگی یا تازه‌عروس و تازه‌داماد بودن از هیچ روشی استفاده نمی‌کردند.

نتیجه‌گیری: بطور کلی رفتارهای باروری بهورزان زن بهتر از بهورزان مرد (همسر بهورزان مرد) و در مجموع مطلوبتر از زنان روستایی مناطق دیگر استان بوده است.

واژه‌های کلیدی: رفتارهای باروری، بهورز، بابل.

مقدمه

بحران جمعیت از حادترین مشکلات جهانی است که بویژه در کشورهای درحال توسعه از شدت بیشتری برخوردار است (۱). در این کشورها افزایش سرسام آور جمعیت مساویست با افزایش سریع فقر، افت شدید وضعیت بهداشتی و کاهش منابع موجود، که حاصلی جز فلاکت و واپس ماندگی در عرصه رقابتهای جهانی را به

همراه نخواهد داشت (۲). لذا با توجه به چنین عواقب تأسف باری است که در کشور ما، جمهوری اسلامی ایران، تحقیق در مسائل کنترل جمعیت از اولین اولویتهای پژوهشی پزشکی در برنامه دوم پنج ساله توسعه

© هزینه‌ای پژوهش در قالب طرح تحقیقاتی شماره ۱۳۷۵۷ از اعتبارات معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل تأمین شده است.

جهت دستیابی به اهداف پیش بینی شده و توصیف عددی نتایج بسته به ضرورت شاخصهای مرکزی و شاخصهای پراکندگی محاسبه گردید. همچنین جهت پاسخ به سئوالات تحقیق از آزمون χ^2 -Square, t-Test استفاده شد.

یافته‌ها

از انجام محاسبات آماری بر روی اطلاعات ۱۷۱ بهورز متاهل شهرستان بابل نتایج زیر حاصل گردید.

۱- میانگین سن کل بهورزان ۳۰/۰۱ سال بود (بهورزان مرد ۳۲/۰۱ و بهورزان زن ۲۸/۶۶ سال) که از این عده ۶۹ نفر از بهورزان مرد (۴۰/۴ درصد) و ۱۰۲ نفر را بهورزان زن (۵۹/۶ درصد) تشکیل می‌دادند. جوانترین بهورز دارای ۱۹ سال و مسن‌ترین آنها دارای ۴۴ سال بوده است (میان ۲۹ سال).

۲- از نظر تحصیلات بهورزان به چهار گروه شامل تحصیلات ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و دیپلم کامل طبقه بندی گردیدند. که در این میان بهورزان با تحصیلات در حد راهنمایی به تعداد ۱۰۲ نفر (۵۹/۶ درصد) حائز اکثریت و بهورزان با دیپلم کامل به تعداد ۶ نفر (۳/۵ درصد) دارای حداقل تعداد بوده‌اند (جدول ۱).

۳- میانگین سن ازدواج در بهورزان زن ۲۰/۴۳ سال و در بهورزان مرد ۲۱/۴۵ سال بوده است که انجام آزمون تی گویای اختلاف معنی داری با $p < ۰/۰۵$ است. همچنین میانگین سن ازدواج همسر بهورزان مرد ۱۷/۴۵ سال بوده که در مقایسه با سن ازدواج بهورزان زن اختلاف معنی داری را نشان می‌دهد ($p < ۰/۰۰۱$). محدوده سنی ازدواج ۱۵ تا ۳۰ سال بوده که در میان آنها تنها یک بهورز زن در ۱۴ سالگی (آن هم قبل از اشتغال به شغل بهورزی) و یک بهورز زن دیگر در ۳۲ سالگی ازدواج نموده‌اند.

۴- میانگین سن اولین حاملگی در بهورزان زن ۲۰/۸۸ سال و در همسر بهورزان مرد ۱۸/۷۷ سال بوده است که در مقایسه با یکدیگر پس از انجام آزمون تی اختلاف معنی

اقتصادی اجتماعی دولت تعیین و توصیه شده است (۳). باتوجه به اینکه در کشور عزیز ما، سهم مهمی از برنامه‌های مربوط به کنترل جمعیت و ارائه خدمات تنظیم خانواده از طریق سیستم مراقبتهای اولیه بهداشتی ارائه می‌گردد و از طرفی بالاترین میزان باروری مربوط به مناطق روستائی است (۴)، اطلاعات و نحوه عملکرد بهورز مرد و زن در خانه بهداشت (روستا) دارای نقش بسیار مهم و تعیین کننده می‌باشد. لذا بر آن شدیم تا با بررسی رفتارهای باروری بهورزان که انعکاس دقیقی از نگرش واقعی و اعتقاد قلبی آنها نسبت به برنامه‌های تنظیم خانواده بوده و صد البته الگوی مناسبی جهت یک رفتار صحیح بهداشتی در میان روستائیان به تحقیق پیرامون وضعیت ارائه خدمات تنظیم خانواده در سیستم ارائه خدمات بهداشتی بپردازیم.

مواد و روشها

به منظور بررسی رفتارهای باروری در بهورزان شهرستان بابل پرسشنامه‌ای متشکل از سئوالاتی متناسب با اطلاعات مورد نیاز تنظیم و با استفاده از پرسشگر آموزش دیده نسبت به تکمیل اطلاعات آن اقدام گردید. بدیهی است با توجه به اینکه بررسی رفتارهای باروری تک تک بهورزان مورد نظر بوده است، تکمیل پرسشنامه برای همه بهورزان متاهل انجام پذیرفته است. تکمیل پرسشنامه‌های تحقیق از مرداد ماه سال ۱۳۷۵ الی مهرماه همین سال بطول انجامیده که البته در طی این مدت به منظور حصول اطمینان کافی به صحت مندرجات پرسشنامه و اصلاح نواقص احتمالی، پرسشنامه‌های مجددی تقریباً برای همه بهورزان با فاصله زمانی حدود یک الی دو ماه تکمیل گردید که مقایسه نتایج پرسشنامه‌های مجدد با نسخه‌های نخستین گویای صحت و دقت مطالب نگاشته بوده است. اطلاعات حاصل از پرسشنامه‌های ۱۷۱ بهورز زن و مرد متاهل با کمک نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

بهورزان نشان داده است که تنها ۵۷/۴ درصد از زوجین از یکی از روشهای مطمئن تنظیم خانواده استفاده می‌کنند. ۲۸/۴ درصد از روشهای طبیعی و ۱۴/۲ درصد (۲۲ نفر) از هیچ روشهای مطمئن تنظیم خانواده استفاده نمی‌کنند. در دسته اخیر علت عدم استفاده عبارتست از ۵ نفر نازا، ۷ نفر حامله، ۵ نفر تازه‌عروس، ۲ نفر تازه‌داماد، یک نفر بدلیل فوت همسر و دو نفر فاقد دلیل مشخصی می‌باشند (جدول ۳، شکل ۱).

بحث

نظر به اینکه مطالعه حاضر با هدف بررسی رفتارهای باروری بهورزان متأهل شهرستان بابل انجام پذیرفته، لذا در ادامه نتایج حاصل از تحقیق بگونه‌ای که تأمین‌کننده اطلاعات مورد نیاز در خصوص موضوع فوق باشد، مورد بحث قرار گرفته است. بررسی بر روی میانگین سن ازدواج بهورزان زن و همسر بهورزان مرد نشان داده است که میانگین سن ازدواج در بهورزان زن (۲۰/۴۳ سال) بیش از همسر بهورزان مرد (۱۷/۴۵) و زنان روستائی استان مازندران (۱۷/۴ سال) می‌باشد (۷)، حال آنکه این اختلاف بین همسر بهورزان و روستائیان چندان نیست. همچنین این مقادیر در مقایسه با مقادیر مشابه در طی یک بررسی انجام شده در استان کرمان در سال ۱۳۷۱ نشان می‌دهد که میانگین سن ازدواج بهورزان زن بالاتر و میانگین سن ازدواج همسر بهورزان مرد پائین‌تر از مقادیر مشابه می‌باشد (به ترتیب ۲۰/۲ و ۱۸/۶ سال) (۵). لذا تشویق و ترغیب هرچه بیشتر بهورزان به خودداری و اجتناب از ازدواج در سنین کمتر از ۱۸ سال بویژه در میان بهورزان مرد در زمان انتخاب همسر شایان تذکر می‌باشد. در مقایسه‌ای که بین سن اولین حاملگی در میان بهورزان زن و همسر بهورزان مرد صورت پذیرفت، مشخص گردید که به ترتیب میانگین سن اولین حاملگی در بهورزان زن بیش از همسر بهورزان مرد و هر دو بیش از زنان روستائی استان بوده است (به ترتیب ۲۰/۹ - ۱۸/۸

داری را بازگو می‌نماید) ($p < 0/001$). پائین‌ترین سن حاملگی در بهورزان زن ۱۵ سالگی (دو مورد) و در همسر بهورزان مرد در ۱۴ سالگی (یک مورد) بوده که کلیه موارد در قبل از اشتغال به شغل بهورزی بود.

۵- مطالعه بر روی تعداد اولاد بهورزان گویای آن بوده است که میانگین تعداد اولاد بهورزان ۲/۰۳ (در بهورزان مرد ۲/۷ و در بهورزان زن ۱/۷) و حداکثر تعداد اولاد ۶ نفر می‌باشد. که در این میان ۶۷/۷ درصد بهورزان دارای دو اولاد و یا کمتر از آن و تنها ۱۶/۱ درصد بهورزان دارای ۴ اولاد یا بیشتر از آن بوده‌اند (جدول ۲).

انجام آزمون آماری تی گویای آن است که تعداد اولاد در بهورزان زن بطور معنی داری کمتر از بهورزان مرد (همسر بهورزان مرد) می‌باشد ($p < 0/005$). البته آزمون آماری کای-دو وجود همبستگی معنی داری را بین سطح تعداد اولاد نشان نداده است.

۶- بررسی سابقه کار در بین بهورزان نشان می‌دهد که میانگین سابقه کار در مردان ۶/۶ و در زنان ۷/۸ سال می‌باشد و در کل میانگین سابقه کار برابر با ۷/۳ سال بوده است. حداقل سابقه کار کمتر از یکسال بوده که در مورد ۱۵ تن از بهورزان صادق است و بیشترین آن ۱۹ سال می‌باشد.

۷- میانگین فاصله بین موالید در میان بهورزان (به استثنای بهورزانی که دارای یک حاملگی بوده‌اند) ۴۰/۸ ماه محاسبه گردید (نزد بهورزان زن ۴۲/۸ ماه و همسر بهورزان مرد ۳۸/۷ ماه) که تفاوت معنی دار نیست. قابل توجه اینکه ۲۳/۹ درصد از زنان بهورز و ۱۶/۷ درصد از همسر بهورزان مرد دارای میانگین فاصله موالید کمتر از ۲۴ ماه بوده‌اند.

۸- میانگین فاصله بین دو حاملگی آخر در میان بهورزان زن ۵۵/۹ و در همسر بهورزان مرد ۴۰/۷ ماه بدست آمده که انجام آزمون تی گویای وجود اختلاف معنی داری در بین آنهاست ($p < 0/025$).

۹- بررسی بر روی روشهای مختلف تنظیم خانواده در میان

جدول ۱. توزیع فراوانی (مطلق و نسبی) بهورزان متأهل شهر بابل به تفکیک جنس و سطح تحصیلات - سال ۱۳۷۵.

جنس	زن		مرد		جمع	
	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد
در حد ابتدائی	۲۵	۲۴/۵	۲	۲/۹	۲۷	۱۵/۸
در حد راهنمایی	۵۹	۵۷/۸	۴۳	۶۲/۳	۱۰۲	۵۹/۶
در حد دبیرستان	۱۷	۱۶/۷	۱۹	۲۷/۵	۳۶	۲۱/۱
دیپلم کامل	۱	۱	۵	۷/۳	۶	۳/۵
جمع	۱۰۲	۱۰۰	۶۹	۱۰۰	۱۷۱	۱۰۰

جدول ۲. توزیع فراوانی (مطلق و نسبی) تعداد اولاد در بهورزان متأهل شهر بابل - سال ۱۳۷۵.

تعداد اولاد	فراوانی	درصد	درصد تجمعی
بدون اولاد	۱۵	۹/۷	۹/۷
یک اولاد	۵۱	۳۲/۹	۴۲/۶
دو اولاد	۳۹	۲۵/۲	۶۷/۷
سه اولاد	۲۵	۱۶/۱	۸۳/۹
چهار اولاد	۱۸	۱۱/۶	۹۵/۵
پنج اولاد	۴	۲/۶	۹۸/۱
شش اولاد	۳	۱/۹	۱۰۰
جمع	۱۵۵	۱۰۰	۱۰۰

خطرات ناشی از حاملگی‌های کمتر از سن ۲۰ سالگی ضروری بنظر می‌رسد. شایان ذکر است که در بررسی آگاهی، بینش و عملکرد زنان روستائی ۱۵-۴۹ ساله کشور به این نتیجه دست یافتند که در $\frac{3}{4}$ آنها حاملگی زیر ۲۰ سال شایع بوده است (۶).

در مطالعه انجام شده بر روی میانگین تعداد اولاد، میانگین تعداد اولاد بهورزان زن و مرد به ترتیب ۱/۷ و ۲/۷ نفر و میانگین مجموع ۲/۰۳ نفر بوده است که اگرچه نتیجه‌ای رضایتبخش بنظر می‌رسد اما بدلیل میانگین سنی

و ۱۸/۳ (سال). البته لازم به ذکر است درصدی از بهورزان زن (۳۷/۴ درصد) و همسر بهورزان مرد (۶۳/۱ درصد) اولین حاملگی خود را در سنین کمتر از ۲۰ سال تجربه کرده‌اند که این مقادیر در مقایسه با بهورزان زن کرمانی نسبتاً مشابه اما در مقایسه با همسر بهورزان مرد (۵۱/۴ درصد) به مقدار قابل ملاحظه‌ای بیشتر است. لذا با توجه به اهمیتی که این موضوع در حفظ سلامت مادر و کودک داشته و عدم رعایت آن می‌تواند خطراتی را برای آنها بدنبال داشته باشد، لزوم تأکید هر چه بیشتر و آموزش

جدول ۳. توزیع فراوانی نسبی استفاده از روشهای مختلف تنظیم خانواده
در خانواده بهورزان متأهل شهرستان بابل (سال ۱۳۷۵) در مقایسه با جمعیت عمومی ایران

روش تنظیم خانواده	جمعیت عمومی ایران *	بهورزان متأهل **	نوع وسیله پیشگیری
	زنان شهری (%)	زنان روستائی (%)	درصد
قرص	۱۹/۲	۲۵/۹	۲۱/۹
آی - یو - دی	۱۰/۷	۳/۹	۶/۵
کاندوم	۸/۱	۴/۷	۱۱/۶
منقطع و طبیعی	۲۵/۳	۱۰/۲	۲۸/۴
بستن لوله‌ها	۱۳/۱	۱۱/۱	۱۶/۸
سایر	۱/۳	۳/۵	۰/۶
عدم پیشگیری	۲۲/۱	۴۰/۷	۱۴/۲

* داده‌های این ستون از نتایج طرح بررسی عملکرد زنان ۴۹-۱۵ ساله شوهردار ایرانی در زمینه استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری در سال ۱۳۷۳ استخراج شده است. (۷)
** بهورزان متأهل شهرستان بابل

شهر کرمان درباره تنظیم خانواده نیز صادق است (۸). مطالعه روی میزان استفاده از روشهای مطمئن پیشگیری از بارداری در میان بهورزان نشان می‌دهد که اگرچه نسبت استفاده از روشهای مطمئن در میان بهورزان (۵۷/۴ درصد) از مقدار بالائی در مقایسه با زوجهای کشورهای در حال توسعه برخوردار است (۵۱ درصد)، ولی هنوز با مقدار مطلوب آن فاصله داشته و نیازمند به رسیدگی است (۹). مطالعه میانگین فاصله بین موالید در میان بهورزان و همسر بهورزان مرد به ترتیب ۴۲/۸ و ۳۸/۷ ماه بوده که این مقادیر در مقایسه با میانگین فاصله بین موالید در بهورزان زن و همسر بهورزان مرد استان کرمان وضعیت مطلوبتری را نشان می‌دهد (به ترتیب ۳۳/۱ و ۳۱/۲ ماه) و جای بسی خوشوقتی است. البته باید اشاره نمود که در همین شرایط حدود ۲۳/۹ درصد از بهورزان زن و ۱۶/۷ درصد از همسر بهورزان مرد دارای میانگین فاصله بین موالید کمتر از ۲ سال (۲۴ ماه) بوده‌اند که نیازمند توجه و رسیدگی است. میانگین فاصله بین دو حاملگی آخر در

پائین بهورزان و احتمال افزایش تعداد اولاد تا چند سال آینده، این رقم نگران کننده است. این نگرانی زمانی بهتر قبل درک خواهد بود که با مطالعه آمار حاصل می‌بینیم، با توجه به میانگین فوق، ۳۲/۳ درصد از بهورزان (۵۰ نفر) دارای ۳ اولاد یا بیشتر هستند و تنها ۱۶/۸ درصد آنها (۲۶ نفر) با بستن لوله‌های رحمی یا وازکتومی به باروری خاتمه داده‌اند. همچنین در میان مابقی آنها ۲۸/۴ درصد (۴۴ نفر) از روشهای غیر مطمئن پیشگیری از بارداری استفاده می‌کنند، البته لازم به ذکر است که جمعی حدود ۲۲ نفر نیز (۱۴/۲ درصد) به دلایل مختلف همچون نازائی، حاملگی، تازه داماد یا تازه عروس بودن از هیچگونه روش تنظیم خانواده‌ای استفاده نمی‌کنند. ضمناً مقایسه نتایج این تحقیق با اطلاعات بهورزان استان کرمان در خصوص میانگین تعداد اولاد بهورزان و درصد افراد دارای اولاد بالای ۳ (۲/۰۲ اولاد، ۲۶/۶ درصد)، چشم‌انداز رضایتبخش را پیش رو قرار نمی‌دهد (۷). البته این موضوع در مقایسه با نتایج بررسی بر روی عملکرد ماماهاى متأهل

دارد اما هنوز با وضعیت مطلوب در خصوص رفتارهای باروری و اهداف مورد نظر در برنامه تنظیم خانواده فاصله داشته و نیازمند رسیدگی و اصلاح موانع و نواقص موجود در راه رسیدن به هدف نهائی می باشد.

تقدیر و تشکر

بدینوسیله از همکاری و مساعدتهای صمیمانه معاونت های پژوهشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل و پرسنل خستگی ناپذیر آموزشگاه بهورزی قدردانی و همچنین از سرکار خانم بنار جهت تایپ مقاله حاضر تشکر می شود.

بین بهورزان زن ۵۵/۹ و همسر بهورزان مرد ۴۰/۷ ماه بوده که علاوه بر بهتر بودن فاصله بین دو حاملگی آخر در بین بهورزان زن نسبت به همسر بهورزان مرد، در مقایسه با میانگینهای مشابه در بهورزان استان کرمان وضع مطلوبتری را به نمایش می گذارد (به ترتیب ۳۶/۶ و ۳۴/۸ ماه). این مقادیر در مقایسه با اعداد بدست آمده برای روستائیان مازندران نیز که برابر با ۳۲/۸ ماه محاسبه شده وضع بهتری را با بازگو می کند. در مجموع با مطالعه مطالب فوق می توان اینطور اظهار نمود که اگرچه رفتارهای باروری در بهورزان ما در مقایسه با رفتارهای باروری روستائیان سطح استان کاملاً بهتر و در مقایسه با جامعه بهورزان نقطه دیگری از کشورمان وضع نسبتاً رضایتبخش

منابع

- ۱- ده بزرگی پ. افزایش جمعیت و اثرات سوء آن بر بهداشت جامعه، فصلنامه دانشکده پرستاری و مامائی حضرت فاطمه، ۱۳۷۰؛ شماره ۴.
- ۲- جهانگیری ج. جمعیت، چشمان جنوب نگران است، روزنامه همشهری، شماره ۸۴۷، ۹ آذر ۱۳۷۴.
- ۳- معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کلیات پژوهش پزشکی در برنامه دوم پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مرداد ماه ۱۳۷۱.
- ۴- رحمانی ق. تحول در فرهنگ شرط اساسی کاهش موالید، راز بهزیستی از انتشارات مرکز بهداشت و درمان استان خراسان، ۱۳۷۲؛ (۵)۲.
- ۵- نیکیان ی، یاسمی م، روحانی ع. تعیین میانگین فاصله بین موالید نزد بهورزان متأهل استان کرمان در سال ۱۳۷۱، مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ۱۳۷۳؛ ۱(۲): ۷۸-۷۱.
- ۶- ملک افضلی ح، رضائی م، ذوالفقاری ع. بررسی آگاهی، بینش و عملکرد زنان ۴۹-۱۵ ساله همسر دار روستاهای ایران نسبت به برنامه های تنظیم خانواده، فصلنامه سلامتی، ۱۳۷۲؛ شماره ۵.
- ۷- معتمدی ب، یاسمی م، نیکیان ی. بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد ماماهاى متأهل شهر کرمان درباره تنظیم خانواده، مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ۱۳۷۳؛ ۱(۴): ۱۹۷-۱۸۹.
- ۸- کریم زاده ک. تنظیم خانواده و نقش سازمان جهانی بهداشت، بهداشت جهان، ۱۳۷۴؛ ۱۰(۲).
- ۹- معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بررسی سلامت و بیماری در ایران، استان مازندران، سال ۱۳۶۹.