

اثر تغذیه زودهنگام بر عوارض گوارشی و رضایتمندی بیماران بعد از سزارین تحت بیهوشی عمومی

لیلی سخاوت*، مژگان کریمی زارچی، افسرالسادات طباطبایی

استادیار گروه زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی یزد

سابقه و هدف: از گذشته اعتقاد بر این بوده است که بیماران پس از جراحی های شکم باید تا زمان برگشت صداهای روده ای از راه دهان مواد غذایی دریافت نکنند. مطالعه زیر با هدف بررسی اثر تغذیه زودهنگام بعد از سزارین بر عوارض گوارشی و رضایتمندی بیماران صورت گرفته است.

مواد و روشها: در یک مطالعه کار آزمایشی بالینی در بیمارستان شهید صدوقی یزد ۲۲۰ زن سزارین شده بطور تصادفی به دو گروه ۱۱۰ نفر (گروه تغذیه زودهنگام) ۲ ساعت بعد از سزارین و ۱۱۰ نفر دیگر (گروه کنترل) ۱۲ ساعت بعد از عمل، تقسیم شدند و سپس مایعات و در صورت تحمل رژیم جامد دریافت داشتند. دو گروه از نظر زمان شروع صداهای روده ای، دفع گاز، وجود تهوع و استفراغ، رضایتمندی بیماران و مدت بستری شدن در بیمارستان با هم مقایسه شدند.

یافته ها: در گروه تغذیه زودهنگام صداهای روده ای زودتر شنیده شد، همچنین در این گروه دفع گاز، دفع مدفوع و تحمل زودتر بود. تحمل رژیم غذایی عادی در گروه تغذیه زودهنگام زودتر اتفاق افتاد ($8/6 \pm 2/1$) در مقابل $20/9 \pm 5/9$ ، $p=0/00$ ، عوارض گوارشی در دو گروه تفاوت معنی دار نداشت. میانگین مدت بستری شدن بر حسب ساعت در گروه تغذیه زودهنگام $26/7 \pm 4/3$ و در گروه تغذیه دیرهنگام $54/1 \pm 2/8$ بود $p=0/00$. میزان رضایتمندی بیماران در گروه تغذیه زودهنگام بیشتر از گروه تغذیه دیرهنگام بود ($79/2 \pm 12/1$) در مقابل $50/1 \pm 13/9$ ، $p=0/01$.
نتیجه گیری: تغذیه زودهنگام بعد از سزارین می تواند باعث شروع زودتر رژیم عادی، کوتاه شدن مدت بستری در بیمارستان و رضایتمندی بیشتر بیماران گردد.

واژه های کلیدی: زودهنگام، دیرهنگام، تغذیه، عوارض گوارشی، سزارین.

دریافت: ۸۷/۳/۶، ارسال جهت اصلاح: ۸۷/۴/۱۹، پذیرش: ۸۷/۶/۲۷

مقدمه

پریستالتیسم روده و برگشت زودتر عملکرد آن را تحریک کند (۴). سزارین از شایع ترین عمل جراحی زنان است و گرچه مدت عمل کوتاهی دارد و دستکاری روده ها در حین عمل آن نیز ناچیز است ولی در اکثر بیمارستانها بطور روتین بیماران سزارین شده تا حداقل ۱۲ ساعت و یا تا زمان بازگشت صداهای روده ای و دفع گاز از تغذیه دهانی منع می شوند. مطالعات نشان داده است که شروع زودهنگام تغذیه دهانی بعد از عمل سزارین عوارض گاسترو اینتستینال را افزایش نمی دهد (۵-۸). Lzbizky گزارش کرد که شروع زود تغذیه دهانی بعد از سزارین همراه با کاهش درد نسبت به

از گذشته اعتقاد جراحان بر این بوده است که بیماران پس از جراحی های شکم باید تا زمان برگشت صداهای روده ای از راه دهان مواد غذایی دریافت نکنند. این امر به علت ترس از ایجاد تهوع و استفراغ بعد از شروع تغذیه از راه دهان و ایجاد ایلئوس و نفخ شکم و ممانعت از دفع مدفوع بوده است (۱۰۲). اخیرا در یک مطالعه کار آزمایشی بالینی گزارش شد که برداشتن فشار گاز از روی معده و تاخیر در شروع تغذیه دهانی تا دفع اولین گاز ایلئوس را طولانی کرده و فایده ای در کاهش استفراغ و اتساع شکمی ندارد (۳). از طرف دیگر Mac millan نشان داد که مصرف غذا ممکن است

آنهایی که تغذیه دیرهنگام داشتند (۹). کاهش طول مدت بستری شدن بیمار به منظور کاهش هزینه و افزایش چرخش تختهای بیمارستانی در عین حال که خطری متوجه سلامتی بیمار نشود، از اهداف جامعه نوین پزشکی می باشد. مطالعات اخیر نشان داده که شروع زودتر تغذیه دهانی می تواند در ترخیص زودتر بیمار از بیمارستان موثر باشد (۱۱ و ۱۰ و ۷).

مطالعه کنونی با هدف بررسی اثر تغذیه زودهنگام بر عوارض گوارشی بعد از عمل، کاهش مدت بستری شدن بیماران و رضایتمندی آنها و مقایسه آن با روش قبلی (تغذیه دیرهنگام) انجام گرفت.

مواد و روشها

در یک مطالعه کار آزمایی بالینی که در بیمارستان شهید صدوقی یزد از سال ۱۳۸۵-۱۳۸۶ انجام گرفت. در این تحقیق، ۲۲۰ زن باردار که به علل مختلف تحت عمل سزارین قرار گرفتند، بطور تصادفی با استفاده از جدول تصادفی زوج و فرد اعداد به دو گروه تقسیم شدند. شرایط حذف از مطالعه سابقه بیماریهای گاسترو اینتستینال قبل از سزارین مثل اولسر پپتیک، ازوفاژیت، روده تحریک پذیر (Irritable bowel syndrome)، انسداد روده، بیماری التهابی روده، سابقه جراحی معده و یا روده، عوارض مامایی مثل کبد چرب حاملگی، پره اکلامپسی، دکلان جفت، کوریو امینیوت و همچنین عوارض حین عمل مثل خونریزی شدید بود.

برای تمام افراد واجد شرایط نوع مطالعه، نحوه انجام آن و عوارض احتمالی درمان، تشریح و از آنها اجازه کتبی گرفته شد. پر کردن پرسشنامه ها توسط فردی انجام شد که از گروه بندی افراد مورد مطالعه بی اطلاع بود. تمام اعمال جراحی توسط یک نفر (پژوهشگر) انجام شد تا مدت و شرایط عمل یکسان باشد. برای تمام بیماران از سوند فولی در طول مدت عمل استفاده شد که بلافاصله بعد از اتمام سزارین برداشته شد. برای تمام افراد مورد مطالعه آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک به روش روتین (استفاده از سفالوسپورینها بلافاصله بعد از بریدن بند ناف و ۶ ساعت بعد از آن) استفاده شد. نوع بیهوشی در هر دو گروه یکسان و از نوع بیهوشی عمومی بود. مراقبتهای بعد از عمل توسط رزیدنت سال سوم زنان و زایمان و تحت نظارت پژوهشگر انجام گرفت. درحین عمل و مدت ریکاوری سرم رینگر یک لیتر به اضافه ۱۰۰ واحد اکسی توسین

(طبق روتین بیمارستان) تجویز شد و سپس تا تحمل کامل رژیم مایعات ادامه داده شد. در صورت افزایش میزان خونریزی از متیل ارگونوین وریدی و یا تران اگزامیک اسید وریدی جهت کنترل خونریزی استفاده می شد. بعد از سزارین بطور تصادفی به ۱۱۰ نفر (گروه تغذیه زودهنگام) بعد از ۲ ساعت مایعات و سپس در صورت تحمل به تدریج رژیم نیمه جامد و جامد شروع شد (در مطالعات انجام شده تغذیه زودهنگام در ساعت ۶ و ۸ بعد از عمل شروع می شد (۸-۷)، ولی چون ریکاوری بعد از عمل سزارین دوساعت است و بعد از این مدت مادر هوشیار بوده و می تواند به نوزاد خود شیر بدهد، در این تحقیق تغذیه زودهنگام ۲ ساعت بعد از عمل در نظر گرفته شد) و به ۱۱۰ نفر طبق برنامه قبلی بیمارستان تا ۱۲ ساعت از طریق وریدی و سپس برای آنها مایعات و در صورت تحمل به تدریج رژیم نیمه جامد و غذای جامد شروع شد. افراد هر دو گروه از نظر استفراغ بعد از شروع رژیم مایعات، شنیدن صداهای روده ای، دفع گاز و مدفوع و عوارض گوارشی بررسی شدند. هنگام ترخیص بیماران، از آنها در مورد روش تغذیه بعد از عمل پرسیده شد و رضایتمندی آنها از طریق نشان دادن خط کش مندرج (Visual Analog Scale =VAS) از صفر تا ۱۰۰ توسط خود بیمار نشان داده شد (صفر عدم رضایت و صد رضایت کامل). داده ها جمع آوری و با استفاده از تستهای T student و chi-square مقایسه شدند و $p < 0.05$ معنی دار تلقی شد.

یافته ها

میانگین سن مادر با تغذیه زودهنگام $28 \pm 4/2$ و با تغذیه دیرهنگام $29 \pm 5/9$ و میانگین سن حاملگی با تغذیه زودهنگام $37 \pm 1/8$ و با تغذیه دیرهنگام $38 \pm 1/6$ در هفته و میانگین تعداد حاملگی $2 \pm 1/2$ در تغذیه زودهنگام و $2 \pm 0/9$ در تغذیه دیرهنگام بود. تغییرات حین عمل افراد با تغذیه زودهنگام و دیرهنگام پس از سزارین نشان داد که بیشترین علت سزارین در دو گروه انتخابی بود ($69/1$ ٪ در گروه تغذیه زودهنگام و $63/6$ ٪ در گروه تغذیه دیرهنگام). برش روی پوست در $19/1$ ٪ از گروه تغذیه زودهنگام و $17/3$ ٪ از گروه تغذیه دیرهنگام طولی و بقیه عرضی بود و چسبندگی داخل شکم در تغذیه زودهنگام $14/5$ و دیرهنگام $12/7$ درصد بود و دو گروه از نظر میزان چسبندگی و طول مدت عمل با یکدیگر یکسان بودند (جدول شماره ۱). هیچکدام از افراد دو گروه

بحث و نتیجه گیری

مطالعه حاضر نشان داد که شنیدن صداهای روده ای، دفع گاز و دفع مدفوع در گروهی که تغذیه آنها ۲ ساعت بعد از عمل شروع شده بود، زودتر از گروهی که تغذیه آنها طبق برنامه بیمارستان ۱۲ بعد از عمل شروع شده بود اتفاق افتاد و در نتیجه خروج بیمار از تغذیه داخل وریدی (قطع مایع درمانی تزریقی) نیز زودتر و مدت بستری شدن بیمار در بیمارستان نیز کوتاهتر بود. در صورتیکه عوارض گوارشی بعد از عمل مثل استفراغ، ایلئوس بعد از عمل و اتساع شکم نیز بیشتر نشد.

نتیجه مطالعه فعلی تایید کننده مطالعات Teoh و Mulayim است، با این تفاوت که در این دو مطالعه به جای بیهوشی عمومی برای بیماران از آناستزی ناحیه ای استفاده شده بود (۷ و ۱۲). در مطالعه Kovavisarach ۸ ساعت بعد از عمل به عنوان تغذیه زود هنگام اطلاق شده است (۸) در صورتیکه ۸ ساعت مدت زیادی است. در مطالعه ما بلافاصله بعد از خروج بیمار از بخش ریکاوری تغذیه مایعات از راه دهان شروع و به تدریج اضافه می شد تا به تحمل تغذیه مواد جامد کمک کند و این مسئله باعث می شد که عدم تحمل به رژیم جامد ایجاد نشود این مخالف روش مطالعه انجام شده توسط Charoenkwan و همکارانش است که مواد جامد را بعد از هوشیاری بیماران شروع کردند و در نتیجه عدم تحمل بیماران به رژیم دریافتی در مطالعه آنها بیش از ۵۰٪ بود (۱۳). در مطالعه ما عوارض گوارشی در هیچکدام از افراد دو گروه دیده نشد لذا نشان دهنده آن است که تغذیه زود هنگام باعث افزایش عوارض گوارشی نمی شود. همانطور که در مطالعات مشابه نیز این مورد گزارش شده است (۷ و ۱۲). در مطالعه فعلی مدت بستری شدن بیماران که تغذیه زود هنگام داشتند، حدود ۳۰ ساعت کمتر از بیماران بود که تغذیه آنها دیرتر شروع شده بود. این گزارش در مطالعات Charoenkwan، Teoh و Mulayim نیز دیده شد (۷ و ۱۲ و ۱۳).

ترخیص زودتر بیماران از نظر افزایش چرخش تخته های بیمارستانی و کاهش هزینه های بیمارستانی اهمیت دارد. همچنین بستری شدن بیشتر بیماران می تواند منجر به افزایش عفونتهای بیمارستانی نیز گردد (۱۴). رضایتمندی بیماران که بعد از سزارین تغذیه زود هنگام داشتند بالای ۷۵ درجه سنجش بود. در حالیکه Charoenkwan رضایتمندی را در دو گروه مطالعه اش یکسان

دچار آتونی و یا خونریزی غیر طبیعی بعد از عمل نشدند. ۱۹ نفر در گروه تغذیه زود هنگام و ۱۶ نفر در گروه تغذیه دیر هنگام یک ساعت بعد از شروع مایعات دچار استفراغ شدند که از نظر آماری تفاوت معنی دار نبود. ۶ نفر از گروه تغذیه زود هنگام و ۸ نفر در گروه تغذیه دیر هنگام تا دو ساعت بعد از شروع مایعات استفراغ داشتند. جدول شماره ۲ نشان دهنده عوارض بعد از عمل و مدت بستری شدن بیماران را نشان می دهد به طوری که میانگین شنیدن صداهای روده ای در گروه تغذیه زود هنگام ۱۳/۵ ساعت و در گروه تغذیه دیر هنگام ۲۶/۷ ساعت بود ($p=0/00$). همچنین دفع گاز و دفع مدفوع نیز در گروه تغذیه زود هنگام به طور معنی دار زودتر اتفاق افتاد. هیچکدام از بیماران دو گروه دچار عوارض گوارشی نشدند. میزان رضایتمندی بیماران دو گروه تغذیه زود هنگام بیشتر از گروه تغذیه دیر هنگام بود.

جدول شماره ۱. تغییرات حین عمل افراد در تغذیه زود هنگام و

دیر هنگام (بر حسب ساعت) پس از سزارین.

تغییرات حین عمل	زود هنگام	دیر هنگام	p-value
طول مدت عمل (دقیقه)	۲۵±۱۲/۷	۲۷±۱۱/۳	۰/۱
میزان دفع ادرار (ml)	۱۴۱/۵±۲۴/۱	۱۳۵/۷±۲۸/۴	۰/۲
میزان دریافت مایع (ml)	۱۱۵۰±۱۱۴	۱۱۸۰±۱۲۱	۰/۱

جدول شماره ۲. عوارض گوارشی بعد از عمل و مدت بستری در

دو گروه با تغذیه زود هنگام و دیر هنگام پس از سزارین.

تغذیه	زود هنگام	دیر هنگام	p-value
تغییرات (ساعت)	Mean±SD	Mean±SD	
شنیدن صدای روده ای	۱۳/۵±۳/۰	۲۶/۷±۴/۸	۰/۰۰
دفع گاز	۲۱/۱±۵/۲	۳۲/۹±۳/۴	۰/۰۰
دفع مدفوع	۳۰/۲±۳/۳	۳۴/۳±۳/۶	۰/۰۴
شروع رژیم عادی	۸/۶±۲/۱	۲۰/۹±۵/۹	۰/۰۰
مدت بستری در بیمارستان	۲۶/۶±۴/۳	۵۴/۱±۳/۸	۰/۰۰
رضایتمندی بیمار	۷۹/۲±۱۲/۱	۵۰/۱±۱۳/۹	۰/۰۰

بیماران گردد.

گزارش نمود (۱۳) و Izbizky که اثر تغذیه زودهنگام را بر کاهش درد بیماران بررسی کرده بود رضایتمندی بیماران را در گروه تغذیه زودهنگام بیشتر گزارش کرد (۹). شروع زودهنگام تغذیه دهانی بعد از سزارین می تواند باعث بازگشت سریعتر بیمار به رژیم عادی، کاهش مدت بستری شدن بیمار در بیمارستان و رضایتمندی بیشتر

تقدیر و تشکر

بدینوسیله از همکاری خانم دکتر راضیه السادات طباطبایی و پرسنل بخش زنان تشکر و قدردانی می شود.



References

1. Fanning J, Andrews S. Early postoperative feeding after major gynecologic surgery: evidence-based scientific medicine. *Am J Obstet Gynecol* 2001; 185(1): 1-4.
2. Kraus K, Fanning J. Prospective trial of early feeding and bowel stimulation after radical hysterectomy. *Am J Obstet Gynecol* 2000; 182(5): 996-8.
3. Guttillo G, Maneschi F, Franchi M, Giannice R, Scambia G, Benedetti Panici P. Early feeding compared with nasogastric decompression after major oncologic gynecologic surgery: a randomized study. *Obstet Gynecol* 1999; 93(1): 41-5.
4. MacMillan SL, Kammerer Doak D, Rogers RG, Parker KM. Early feeding and the incidence of gastrointestinal symptoms after major gynecologic surgery. *Obstet Gynecol* 2000; 96(4): 604-8.
5. Virojchaiwong P, Benrahm D. The gastrointestinal complication after early oral feeding in term elective cesarean delivery. *Vajira Med J* 2001; 44: 27-35.
6. Patolia DS, Hilliard RL, Toy EC, Baker B. Early feeding after cesarean: randomized trial. *Obstet Gynecol* 2001; 97(1): 113-16.
7. Teoh WH, Shah M K, Mah CL. A randomized controlled trial on beneficial effects of early feeding post-caesarean delivery under regional anesthesia. *Singapore Med J* 2007; 48 (2): 152-7.
8. Kovavisarach E, Atthakorn M. Early versus delayed oral feeding after cesarean delivery. *Int J Gynecol Obstet* 2005; 90(1): 31-4.
9. Izbizky GH, Minig L, Sebastiani MA, Otano L. The effect of early versus delayed post caesarean feeding on women's satisfaction: a randomised controlled trial. *BJOG* 2008; 115(3): 332-8.
10. Mangesi L, Hofmeyr GJ. Early compared with delayed oral fluids and food after caesarean section. *Cochrane Database Syst Rev* 2002; (3): CD003516.
11. Fanning J, Andrews S. Early postoperative feeding after major gynecologic surgery: evidence-based scientific medicine. *Am J Obstet Gynecol* 2001; 185(1): 1-4.
12. Mulyim B, Celik NY, Kaya S, Yanik FF. Early oral hydration after cesarean delivery performed under regional anesthesia. *Int J Gynecol Obstet* 2008; 101(3): 273-6.
13. Charoenkwan K, Palapinyo C. Early solid food after cesarean section and post operative ileus. *Int J Gynaecol Obstet* 2005; 90 (2): 144-5.

14. Chen SY, Wu GH, Chang SC, et al. Bacteremia in previously hospitalized patients: prolonged effect from previous hospitalization and risk factors for antimicrobial-resistant bacterial infections. *Ann Emerg Med* 2008; 51(5): 639-46.

EARLY ORAL FEEDING EFFECT ON GASTROINTESTINAL SYMPTOMS AND PATIENTS' SATISFACTION AFTER CESAREAN DELIVERY UNDER GENERAL ANESTHESIA

L. Sekhavat (MD)^{1*}, M. Karimi Zarchi (MD)², A. Tabatabaai (MD)³

1. *Assistant Professor of Obstetrics & Gynecology, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services, Yazd, Iran, l_sekhavat@yahoo.com, 2. Assistant Professor of Obstetrics & Gynecology, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services, Yazd, Iran

BACKGROUND AND OBJECTIVE: Historically, patients were fasted following abdominal surgery until return of bowel sounds or passage of flatus. The aim of this study was to evaluate the effect of early feeding after caesarean section on the possible adverse gastrointestinal effects and women's satisfaction.

METHODS: In a clinical trial at Shahid Sedughi hospital, Yazd, 220 women delivered by cesarean were randomly divided into two groups. A clear liquid drink was given to 110 women in the early feeding group 2 hours after surgery, and to 110 women in the control group 12 hours after surgery. If the drink was tolerated, solid foods were then given. Two groups were compared in terms of bowel sounds, flatus, nausea and vomiting, women's satisfaction and hospital stay.

FINDINGS: Early feeding group was earlier in first bowel sound, first post operation flatus and defecation. Regular diet is tolerated earlier in early feeding group than delayed feeding group (8.6 ± 2.1 versus 20.9 ± 5.9 hour, $p = 0.00$). There were no significant differences in postoperative gastrointestinal complications. Mean duration of hospitalization was 26.6 ± 4.3 h in early feeding group and 54.1 ± 3.8 h in delayed feeding group ($p = 0.00$). The women's satisfaction in the early feeding group was higher than delayed feeding group (79.2 ± 12.1 vs 50.1 ± 13.9 , $p = 0.01$).

CONCLUSION: Early oral feeding after cesarean delivery was associated with early tolerated regular diet, low duration of hospitalization, high women's satisfaction and no significant adverse gastrointestinal effects compared with delayed feeding.

KEY WORDS: *Early, Late, Oral feeding, Gastrointestinal complication.*

Journal of Babol University of Medical Sciences 2009; 10(6): 67-72

Received: May 26th 2008, Revised: July 9th 2008, Accepted: September 17th 2008.