

## تأثیر عصاره آبی الکلی برگ گیاه جعفری بر بیضه و سلول های دودمانی جنسی موش های صحرایی نر بالغ

سیدابراهیم حسینی<sup>۱\*</sup>، فاطمه بسطام پور<sup>(MSc)</sup><sup>۱</sup>، هیبت الله صادقی<sup>(PhD)</sup><sup>۱</sup>

۱- گروه زیست‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی فارس

۲- مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

دریافت: ۹۲/۹/۲۹، اصلاح: ۹۲/۱۲/۱۵، پذیرش: ۹۳/۲/۲۴

### خلاصه

**سابقه و هدف:** ناباروری از مسائل مهم علم پزشکی است که در بسیاری از موارد به دلیل کمبود سلول های جنسی ایجاد می شود. برای درمان این بیماری از داروهای شیمیایی و گیاهی مختلفی استفاده می گردد. با توجه به اثرات جانبی اکثر داروهای شیمیایی در درمان ناباروری، این مطالعه با هدف بررسی اثر عصاره آبی الکلی برگ جعفری بر وزن بیضه ها و سلول های دودمانی جنسی انجام گرفت.

**مواد و روشها:** در این مطالعه تجربی از ۵۰ سر موش صحرایی نر بالغ استفاده شد. حیوانات به گروه های کنترل، شم و ۳ دسته تجربی دریافت کننده دوزهای  $1/5\text{ g/kg}$  و  $2\text{ g/kg}$  دارای آبی الکلی برگ جعفری تقسیم شدند. تجویزها برای ۲۸ روز و به صورت گاوآخر انجام شد. در پایان دوره، بیضه ها خارج و پس از اندازه گیری وزن بدن و بیضه ها، اقدام به شمارش سلول های دودمانی جنسی گردید.

**یافته ها:** داده ها نشان داد که عصاره برگ جعفری باعث افزایش معنی دار وزن گروه های تجربی دریافت کننده مقادیر حداقل ( $1\text{ g/kg}$ ) و متوسط ( $1/5\text{ g/kg}$ ) و وزن بیضه چپ در گروه های تجربی دریافت کننده مقادیر متوسط  $1/5\text{ g/kg}$  ( $1/320\pm 0/0369$ ) و حداقل  $2\text{ g/kg}$  ( $1/386\pm 0/0581$ ) می باشد و همچنین باعث افزایش معنی دار تعداد سلول های اسپرماتوسیت در هر ۳ دوز، اسپرماتید، اسپرم و سروتولی در دوزهای متوسط و حداقل می گردد ( $p\leq 0/05$ ).

**نتیجه گیری:** برگ جعفری احتمالاً از طریق مهار آنزیم های  $\alpha$ -alfa دوکتاز و آروماتاز، تقویت دفاع آنتی اکسیدانی و کاهش استرس های اکسیداتیو باعث افزایش وزن و سلول های دودمانی جنسی گردیده است.


**واژه های کلیدی:** جعفری، بیضه، سلول های دودمانی جنسی.

### مقدمه

در بیضه می گرددند (۲). امروزه با توجه به آثار سوء و عوارض جانبی بسیاری از داروهای شیمیایی، استفاده از طب سنتی به ویژه، گیاه درمانی مد نظر قرار گرفته است. در سال های اخیر توجه زیادی به مطالعه اثر گیاهان مختلف بر روی باروری پستانداران آزمایشگاهی شده و از نتایج حاصل از این مطالعات اطلاعات ارزشمندی به دست آمده است (۳). مطالعات نشان داده اند که عصاره گیاهانی مانند دانه هویج (۴)، عصاره الکلی گیاه شاهتره (۵)، عصاره سیر (۶)، کرفس (۷)، مرزنچوش (۸)، آویشن کوهی (۹)، زنجبل (۱۰) گرده نخل (۱۱) باعث افزایش میزان تستوسترون، LH و FSH شده و نقش موثری در تنظیم عملکرد محور هیبوتalamوس- هیپوفیز- بیضه می باشد که به عنوان یک سیستم کنترل محور آن صورت می گیرد و فعالیت ترشحی بیضه ها خود نیز تحت کنترل محور هیبوتalamوس- هیپوفیز- بیضه می باشد که به عنوان یک سیستم کنترل عصبی- هورمونی عمل می کند. بخش بزرگی از اعمال جنسی در حیوانات نر و ماده با Gonadotropin Releasing Hormone، GnRH از هیبوتalamوس که خود باعث ترشح و آزاد سازی گنادوتروپین ها (FSH و LH) از هیپوفیزی می گردد، آغاز می شود. هورمون های گنادوتروپین نیز بر روی گنادها اثر گذاشته و باعث آزادسازی هورمون های جنسی

باروری و ناباروری یکی از مسائل مهم و پیچیده در علم پزشکی است. تقریباً ۱۳ درصد از افراد جامعه، نابارور هستند که در این بین شایع ترین علت ناباروری در مردان، عدم توانایی آنان در تولید تعداد کافی اسپرم های سالم و فعال است (۱). اسپرم سازی در بیضه، تحت کنترل هورمون تستوسترون مترشحه از آن صورت می گیرد و فعالیت ترشحی بیضه ها خود نیز تحت کنترل محور هیبوتalamوس- هیپوفیز- بیضه می باشد که به عنوان یک سیستم کنترل عصبی- هورمونی عمل می کند. بخش بزرگی از اعمال جنسی در حیوانات نر و ماده با Gonadotropin Releasing Hormone، GnRH از هیبوتalamوس که خود باعث ترشح و آزاد سازی گنادوتروپین ها (FSH و LH) از هیپوفیزی می گردد، آغاز می شود. هورمون های گنادوتروپین نیز بر روی گنادها اثر گذاشته و باعث آزادسازی هورمون های جنسی

خوارکی به حیوانات مورد آزمایش تهیه شد. نمونه‌ها به ۵ گروه ۱۰ تایی شامل گروه‌های کنترل، شم و تجربی ۱ تا ۳ تقسیم شدند. در این تحقیق گروه کنترل تحت هیچ تیماری قرار نگرفتند و گروه شم نیز روزانه  $0.05\text{ g/kg}$  می‌لیتر آب مقطر را به عنوان حلال دارو و به صورت گاواز دریافت داشتند. با توجه به دوز کشندۀ  $0.05\text{ g/kg}$  عصاره هیدرولالکلی برگ جعفری، سه گروه تجربی ۱ تا ۳ نیز هم زمان در دو نوبت صبح و عصر هر روز، به ترتیب، مقدار ۱،  $0.05\text{ g/kg}$  و  $0.05\text{ g/kg}$  کیلوگرم وزن بدن عصاره هیدرولالکلی برگ جعفری را به صورت گاواز دریافت داشتند. کلیه تجویزها برای مدت ۲۸ روز انجام گردید و سپس در پایان روز بیست و هشت می‌توان از اندازه گیری وزن بدن و بیهوش نمودن حیوانات توسط اتر، در ناحیه شکمی حیوان برش زده شد و اندام‌های تناسلی دو طرف شامل بیضه، اپیدیدیم به دقت خارج گردید. بیضه‌ها با استفاده از ترازوی دیجیتال به دقت توزین و در محلول فرمالین ۱۰ درصد قرار داده شدند تا ضمن ثبیت بافت و تهیه مقاطع بافتی و رنگ آمیزی هماتوکسیلین-اوزین نمونه‌ها، توسط میکروسکوب دوربین دار مدل نیکون ساخت ژاپن و با استفاده از فیلم کوئیکا، فوتومیکرورگراف‌های مربوط تهیه و سلول‌های اجدادی جنسی لوله‌های اسپرم‌ساز در مرکز استریولوژی دانشکده علوم پزشکی پاسخ با مشاهده مقاطع عرضی لوله‌های اسپرم ساز با سطح یکسان از طریق پروب یا شبکه صلبی مورد استفاده چهت شمارش سلول‌ها، تعداد سلول‌های دودمانی جنسی مشخص گردید (شکل ۱).



شکل ۱: پروب یا شبکه صلبی مورد استفاده چهت شمارش سلول‌ها

نتایج به دست آمده با کمک نرم افزار SPSS ۱۸ و آزمون‌های آماری تی و دانکن مورد بررسی و آنالیز آماری قرار گرفتند،  $P \leq 0.05$  معنی دار در نظر گرفته شد.

### یافته‌ها

نتایج حاصل از مطالعه حاضر حاکی از افزایش معنی دار وزن بدن در گروه‌های تجربی دریافت کننده مقدار حداقل  $0.05\text{ g/kg}$  و متوسط  $0.05\text{ g/kg}$  و وزن بیضه چه در گروه‌های تجربی دریافت کننده مقدار متوسط  $0.05\text{ g/kg}$  و حداکثر  $0.05\text{ g/kg}$  (۱/۳۸۶ $\pm$ ۰.۰۵۸۱) (۱) عصاره آبی الکلی برگ جعفری نسبت به گروه کنترل در سطح  $P \leq 0.05$  می‌باشد (جدول ۱). همچنین نتایج نشان دهنده عدم تغییر معنی دار عصاره برگ جعفری بر وزن بیضه راست و تعداد سلول‌های اسپرماتوگونی و افزایش معنی دار تعداد سلول‌های اسپرماتوسیت در هر ۳ گروه تجربی، سلول‌های سرتولی، اسپرماتید و اسپرم در گروه‌های تجربی دریافت کننده مقدار متوسط ( $0.05\text{ g/kg}$ ) و حداکثر ( $0.05\text{ g/kg}$ ) عصاره هیدرولالکلی برگ جعفری نسبت به گروه کنترل می‌باشد ( $P \leq 0.05$ ) (جدول ۲).

گیاهی خوارکی و از خانواده چتریان (Apiaceae) یا Umbelliferae می‌باشد. جعفری گیاهی غنی از ویتامین‌های A، B، C، E و عناصر معدنی مختلف مانند روی، آهن، ترکیبات فلاونوئیدی نظیر لوتولین، آپی زین، کاروتونوئیدها، توکوفرول و کومارین می‌باشد (۱۲ و ۱۳). نشان داده شده است که عصاره برگ جعفری در درمان سنگ کلیه، در کاهش التهابات مزمن، بیماری‌های خودایمنی و در درمان فشار خون بالا موثر است (۱۴ و ۱۵).

با توجه به تحقیقات علمی به عمل آمده، ترکیبات موجود در عصاره جعفری دارای اثرات ضد التهابی، ضد باکتریالی و فعالیت آنتی اکسیدانی است (۱۶). گیاه جعفری غنی از فلاونوئیدها و ویتامین‌هایی است که آنتی اکسیدان‌های موثری در خشی کردن رادیکال‌های اکسیژن دار می‌باشند. گونه‌های فعال اکسیژن قادر به پراکسیداسیون لیپیدهای غشاء اسپرم بوده که این اثر با کاهش حرکت و آسیب بخش‌های غشاء اسپرم همراه است (۱۷). آنتی اکسیدان‌ها ترکیباتی هستند که مانع از تشکیل رادیکال‌های آزاد و پراکسیداسیون لیپیدها می‌شوند و از آسیب سلول اسپرم توسط رادیکال‌های آزاد جلوگیری می‌کنند و کیفیت اسپرم و پارامترهای باروری را بهبود می‌بخشند. استفاده از گیاهان دارویی افزایش باروری و در رفع مواردی از قبیل عدم تعادل هورمونی، ناتوانی جنسی و کمبود سلول‌های جنسی می‌تواند تأثیر مثبت داشته باشد. با توجه به اینکه بررسی‌های اندکی در رابطه با تأثیر عصاره برگ جعفری بر دستگاه تولید مثل جنس نر به ویژه سلول‌های دودمانی جنسی مؤثر بر این سیستم انجام شده است و در برخی از مطالعات، تأثیر عصاره این گیاه بر عملکرد محور هیپوفیز-کاد به اثبات رسیده است این مطالعه با هدف تأثیر عصاره برگ جعفری بر وزن بدن، ساختار بافتی پیشه و سلول‌های دودمانی جنسی در موش صحرایی نر انجام گرفت.

### مواد و روشها

در این مطالعه تجربی که در سال ۱۳۹۲ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس، انجام شد، از ۵۰ سر موش صحرایی نر از نژاد ویستان در محدوده وزنی  $21.0 \pm 5$  گرم و سن  $75 \pm 80$  روز استفاده شد. در طول دوره تجویز، همه حیوانات از آب و غذای یکسان و بدون محدودیت برخوردار بوده و در یک اتاق مخصوص در دمای  $22 \pm 2$  درجه سلسیوس، در شرایط  $12$  ساعت روشنایی و  $12$  ساعت تاریکی نگهداری شدند و آب و غذا به میزان کافی در اختیار آن‌ها قرار گرفت. پروتکل این تحقیق بر اساس قوانین بین‌المللی در مورد حیوانات آزمایشگاهی تنظیم و در کمیته اخلاق دانشگاه به تصویب رسید. در این پژوهش جهت تهیه عصاره آبی الکلی برگ جعفری به مقدار کافی، گیاه تازه و جوان جعفری از مزارع شهرستان فسا تهیه شد و پس از شناسایی دقیق در بخش گیاه شناسی دانشگاه پاسخ، برگ‌های گیاه در سایه و در هوای خنک، خشک و توسط آسیاب برقی پودر گردید. به ازای هر  $100$  گرم پودر یک لیتر آب و اتانول  $96$  درصد به نسبت  $50\%$  از هر کدام اضافه گردید و مخلوط به مدت  $72$  ساعت خیس خورد. هر  $5$  ساعت یک بار ظرف شیشه‌ای تکان داده شد تا مخلوط مورد نظر به خوبی خیس بخورد. آنگاه، پس از صاف کردن محتوای بشر، با استفاده از دستگاه Rotary evaporator مقادیر مورد نظر از عصاره خشک به دست آمده را در آب مقطر حل نموده و به این ترتیب دوزهای مختلف عصاره ( $0.05\text{ g/kg}$ ،  $0.05\text{ g/kg}$  و  $0.05\text{ g/kg}$ ) جهت تجویز

تأثیر عصاره آبی الکلی برگ گیاه جعفری بر یافته یضه و سلول های دودمانی : سید ابراهیم حسینی و همکاران

جدول ۱. مقایسه میانگین وزن بدن و یضه حیوانات در گروه های تیمار شده با عصاره آبی الکلی برگ جعفری نسبت به گروه کنترل (خطای معیار میانگین  $\pm$  میانگین)

گروه	وزن بدن		
	بر حساب گرم	وزن یضه چپ بر حساب گرم	وزن یضه راست بر حساب گرم
کنترل	۲۱۹/۵ $\pm$ ۵/۴۷ <sup>a</sup>	۱/۱۵۵ $\pm$ ۰/۰۶۱۳ <sup>a</sup>	۱/۱۴۵ $\pm$ ۰/۰۳۰ <sup>a</sup>
شم	۲۱۸/۴ $\pm$ ۴/۸۱ <sup>a</sup>	۱/۱۶۶ $\pm$ ۰/۰۴۹۹ <sup>a</sup>	۱/۱۴۴ $\pm$ ۰/۰۵۴۴ <sup>a</sup>
تجربی ۱	۲۴۷/۹ $\pm$ ۱۱/۴۵ <sup>b</sup>	۱/۲۹۲ $\pm$ ۰/۰۴۰۵ <sup>b</sup>	۱/۲۸۵ $\pm$ ۰/۰۱۴۹ <sup>a</sup>
تجربی ۲	۲۵۹/۶ $\pm$ ۸/۸۹ <sup>b</sup>	۱/۳۸۶ $\pm$ ۰/۰۵۸۱ <sup>b</sup>	۱/۳۰۰ $\pm$ ۰/۰۷۸۰ <sup>a</sup>
تجربی ۳	۲۲۴ $\pm$ ۶/۶۲ <sup>a</sup>	۱/۳۲۰ $\pm$ ۰/۰۳۶۹ <sup>b</sup>	۱/۲۶۹ $\pm$ ۰/۰۲۷۰ <sup>a</sup>

وجود حروف مشترک در گروههای مختلف نشان دهنده عدم وجود اختلاف معنی دار و حروف غیر مشترک نشان دهنده اختلاف معنی دار در سطح  $P \leq 0.05$  می باشد.

جدول ۲. مقایسه تعداد سلول های دودمانی اسپرم در گروه های تیمار شده با عصاره آبی الکلی برگ جعفری نسبت به گروه کنترل در مدل شبکه صلبی (خطای معیار میانگین  $\pm$  میانگین)

گروه	سلولهای دودمانی				
	سرتوانی	اسپرم	اسپرماتوگونی	اسپرماتویت	اسپرماتید
کنترل	۶۲/۸ $\pm$ ۲/۴۶۲ <sup>a</sup>	۱۱۴ $\pm$ ۸/۲۹۳ <sup>a</sup>	۷۲/۸ $\pm$ ۴/۷۰۶ <sup>a</sup>	۹۰/۰ $\pm$ ۹/۲۱۰ <sup>a</sup>	۲۱/۶ $\pm$ ۰/۸۳۲ <sup>a</sup>
شم	۶۲/۴ $\pm$ ۱/۶۰۶ <sup>a</sup>	۱۰۳/۳ $\pm$ ۱۱/۳۷۶	۶۹/۹ $\pm$ ۴/۴۲۸ <sup>a</sup>	۹۲/۱ $\pm$ ۸/۰۱۴ <sup>a</sup>	۲۰/۷ $\pm$ ۰/۶۵۰ <sup>a</sup>
تجربی ۱	۶۱/۷ $\pm$ ۳/۵۳۷ <sup>a</sup>	۱۴۴/۵ $\pm$ ۶/۹۳۰ <sup>b</sup>	۶۷/۳ $\pm$ ۵/۹۰۳ <sup>a</sup>	۹۱/۵ $\pm$ ۹/۳۷۰ <sup>a</sup>	۲۳/۴ $\pm$ ۱/۲۲۱ <sup>ba</sup>
تجربی ۲	۶۲/۷ $\pm$ ۲/۱۹۶ <sup>a</sup>	۱۳۹/۱ $\pm$ ۴/۵۷۰ <sup>b</sup>	۸۲/۵ $\pm$ ۵/۱۸۸ <sup>b</sup>	۱۴۵ $\pm$ ۸/۸۰۵ <sup>b</sup>	۲۵/۰ $\pm$ ۱/۲۹۹ <sup>b</sup>
تجربی ۳	۶۵/۶ $\pm$ ۲/۳۰۵ <sup>a</sup>	۱۵۲ $\pm$ ۷/۳۱۰ <sup>b</sup>	۹۱ $\pm$ ۶/۲۲۷ <sup>b</sup>	۱۳۸ $\pm$ ۹/۵۵۵ <sup>b</sup>	۲۶/۲۷ $\pm$ ۱/۶۵۶ <sup>b</sup>

وجود حروف مشترک در گروه های مختلف نشان دهنده عدم وجود اختلاف معنی دار و حروف غیر مشترک در نشان دهنده اختلاف معنی دار در سطح  $P \leq 0.05$  می باشد.

## بحث و نتیجه گیری

موش ها موجب توقف رشد حیوان می گردد. ویتامین A به رتینوئید تبدیل می گردد که موجب ذخیره چربی به صورت تری گلیسرید در بدن شده و موجب افزایش وزن بدن می گردد (۱۹) پس می توان نتیجه گرفت ویتامین A موجود در جعفری نیز می تواند موجب افزایش وزن بدن گردد. با توجه به نتایج بدست آمده در پژوهش حاضر می توان گفت که عصاره جعفری سبب افزایش تعداد سلول های لایه ژرمینال داخل لوله های منی ساز گردیده است. با عنایت به آن که هورمون FSH اثرات مستقیمی بر تولید اسپرماتویت ها در مرحله لپتوتن و پاکی تن دارد و باعث تکثیر سلول های اسپرماتوگونی و تمایز آنها به سلول های اسپرماتویت اولیه نیز می شود (۲۰). همچنین بر اساس تحقیقات انجام شده هورمون FSH با اتصال به گیرنده ای اختصاصی بر سلول های سرتولی باعث تحریک تولید cAMP و فعال شدن پروتئین کیناز باعث فسفریله شدن چندین پروتئین سلولی می گردد و تغییراتی را در سلول سرتولی از نظر اندازه و تعداد سلول ایجاد می کند. بنابراین با توجه به افزایش سطح هورمون FSH توسط عصاره آبی الکلی جعفری که در مطالعه قبلی نشان داده شد (۱۸)، افزایش تعداد سلول های دودمانی جنسی و سرتولی مورد انتظار می باشد. از سوی دیگر، بر اساس مطالعات انجام شده روند اسپرماتوژنر و گذر از سلول های ژرمینال تا رسیدن به مرحله بلوغ سلول های جنسی در گروی مصون ماندن از ضایعات پاتولوژیک و سیتو توکسیکی است که این پدیده را مورد تهدید قرار می دهد (۲۱).

نتایج حاصل از مطالعه حاضر حاکی از افزایش معنی دار وزن بدن و یضه چپ و همچنین افزایش معنی دار سلول های دودمانی جنسی در موس های صحرایی نر در گروه های تجربی دریافت کننده عصاره هیدرو الکلی برگ جعفری می باشد. در یک بررسی نشان داده شد که وزن بدن و یضه ها تحت تأثیر هورمون تستوسترون قرار می گیرد (۴) و با توجه به نتایج مطالعات قبلی که نشان داد عصاره برگ جعفری باعث افزایش هورمون های تستوسترون، در موس های صحرایی نر می شود (۱۸) لذا افزایش وزن بدن، یضه و تعداد سلولهای جنسی اسپرماتویت، اسپرماتیدها و اسپرم کاملاً قابل توجیه است. مطالعات قبلی نشان داده اند که هورمون تستوسترون با اثر مستقیم بر سلولهای سرتولی و ترشح مایع لوعله ای و پروتئین های متعددی نظیر فاکتورهای رشد و ترانسفیرین نقش ویژه ای در تغذیه سلول های جنسی در حال تقسیم، تقسیم سلول های جنسی و در نهایت تولید اسپرم دارند. به این ترتیب با توجه به نقش مهم هورمون تستوسترون در روند اسپرماتوژنر، واضح است که در صورت افزایش این هورمون، تعداد اسپرم افزایش می یابد. نتایج مطالعه حاضر نیز موبید افزایش معنی دار تعداد اسپرم ها پس از تیمار با جعفری است. فلاونوئیدهایی نظیر لوتولین، آپی زین، کاروتونوئیدها، توکوفرول و کومارین از جمله ترکیبات اساسی برگ جعفری می باشند (۱۳). عصاره برگ جعفری سرشار از ویتامین A نیز می باشد (۱۲). ویتامین A یکی از عوامل رشد حیوانات است و فقدان تجربی این ویتامین در

باعث افزایش تعداد اسپرم ها و سلول های دودمانی آن شود. عصاره آبی الکلی برگ گیاه جعفری احتمالا با داشتن ترکیبات فیتواستروژن و از طریق تحریک تولید پرولاتکین و با تقویت دفاع آنتی اکسیدانی و کاهش استرس های اکسیدانتیو موجب افزایش وزن بدن، بیضه چپ و افزایش تعداد سلولهای دودمانی جنسی می شود.

### تقدیر و تشکر

بدینوسیله از رحمات کارکنان حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس که امکانات این تحقیق را فراهم نمودند، تقدیر و تشکر می گردد.

رادیکال های آزاد به دلیل تمایل قوی به گرفتن الکترون، باعث آسیب به دیگر مولکول ها از جمله اسیدهای چرب غشای بیولوژیک و اکسیداسیون آن ها می شوند در نتیجه سیالیت، ساختار و عملکرد غشاء به خطر می افتد (۲۲). استرس های اکسیدانتیو باعث تخریب غشای سلول های دودمان اسپرم می گردد و ترکیبات آنتی اکسیدان قادرند غشای این سلول ها را در برابر این آسیب ها محافظت کنند (۲۳). پژوهش های انجام شده نشان دهنده وجود ترکیب های آنتی اکسیدانی قوی مانند ویتامین های E، C و B و فلاونوئیدها در عصاره جعفری می باشد (۱۶و۱۳) لذا با توجه به آن که مطالعات نشان داده اند که ویتامین های E و C به تکثیر و محافظت از سلول های دودمانی اسپرم کمک می نمایند (۲۴و۲۵) به این ترتیب احتمال دارد عصاره جعفری با تقویت سیستم دفاع آنتی اکسیدانی و کاهش استرس های اکسیدانتیو و از طریق ویتامین های فوق

## Effect of Hydro-Alcoholic Extract of Parsley (*Petroselinum Crispum*) Leaf on the Testicle Tissue and Sexual Dynastic Cells of Adult Male Rats

S.E. Hosseini (PhD)<sup>1\*</sup>, F. Bastamoor (MSc)<sup>2</sup>, H. Sadeghi (PhD)<sup>3</sup>

1. Department of Biology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Fars, I.R. Iran

2. Herbal Medicine Research Center, Yasuj University of Medical Sciences, Yasuj, I.R. Iran

**J Babol Univ Med Sci; 16(9); Sep 2014; pp: 36-42**

**Received: Dec 20<sup>th</sup> 2013, Revised: Mar 6<sup>th</sup> 2014, Accepted: May 14<sup>th</sup> 2014.**

### ABSTRACT

**BACKGROUND AND OBJECTIVE:** Infertility is a major problem in medical science due to low amount of sexual cells. Herbal and chemical medicines are used to treat this disease. Due to the side effects of chemical drugs in treatment of infertility, the aim of this study was to investigate the effect of hydro-alcoholic extract of parsley leaf on testis weight and sexual dynastic cells.

**METHODS:** In this experimental study, 50 adult male rats were used. Animals were divided into control, sham and 3 experimental groups receiving 1, 1.5 and 2 g/kg extract of parsley leaf. Prescriptions were performed as gavage for 28 days. At the end of period, the testes were removed and after measuring body weight and testes, sexual dynastic cells were counted.

**FINDINGS:** Results indicated that parsley leaf extract caused a significant increase in body weight of experimental groups receiving minimum dose of 1gr/kg ( $247.9 \pm 11.45$ ) and medium dose of 1.5gr/kg ( $259.6 \pm 8.89$ ) hydro-alcoholic extract of parsley leaf and caused a significant increase in left testis weight in experimental groups receiving medium dose of 1.5g/kg ( $1.386 \pm 0.0581$ ) and maximum dose of 2g/kg ( $1.320 \pm 0.0369$ ) hydro-alcoholic extract of parsley leaf in compared to control group ( $p \leq 0.05$ ). Also it caused a significant increase in the number of spermatocytes cells at every three dose, spermatids, sperm and sertoli cells at medium and maximum doses ( $p \leq 0.05$ ).

**CONCLUSION:** Parsley leaf caused an increase in weight and sexual dynastic cells by 5alpha-reductase and aromatase inhibition, reinforcing antioxidant defense and reducing oxidative stresses.

**KEY WORDS:** *Parsley, Testis, Sexual dynastic cell.*

### Please cite this article as follows:

Hosseini SE, Bastamoor F, Sadeghi H. Effect of hydro-alcoholic extract of parsley (*Petroselinum Crispum*) leaf on the testicle tissue and sexual dynastic cells of adult male rats. J Babol Univ Med Sci 2014;16(9):36-42.

\* Corresponding Author; S.E. Hosseini (PhD)

Address: Science and Research Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, I.R. Iran

Tel: + 98 728 4692032

E-mail: ebrahim.hossini@yahoo.com

## References

- 1.Aitken RJ. The Amoroso lecture. The human spermatozoon-- a cell in crisis. *J Reprod Fertil* 1999;115(1):1-7.
- 2.Chen CC, Fernald RD. GnRH and GnRH receptors: distribution, function and evolution. *J Fish Biol* 2008;73(5):1099-120.
- 3.Parandin R, Ghorbani R, Sadeghipour Roodsari HR. Effects of alcoholic extract of Achillea Millefolium flowers on fertility parameters in male rats. *J Shahid Sadoughi Univ Med Sci* 2011;19(1):84-93.
- 4.Nouri M, Khaki A, Fathi Azar F, Rashidi MR. The protective effects of carrot seed extract on spermatogenesis and cauda epididymal sperm reserves in gentamicin treated rats. *Yakhteh Med J* 2009;11(3):327-32.
- 5.Naseri M, Heydari Nasrabadi M, Khodarahmi P, Ahmadi F, Mojibi P, Abotalebei H. Study of the effect of Fumaria parviflora alcoholic extract on spermatogenesis in male rats. *New Cell Mol Biotechnol J* 2011;1(2):61-5.
- 6.Mirfard M, Johari H, Mokhtari M, Hematkhah V, Jamali H, Allahverdi Gh. The effect of hydro-alcoholic garlic extract on testis weight and spermatogenesis in mature male rats under chemotherapy with cyclophosphamide. *J Fasa Univ Med Sci* 2011;3(2):67-74. [in Persian]
- 7.Kooti W, Ghasemiboroon M, Ahangarpoor A, et al. The effect of hydro-alcoholic extract of celery on male rat in fertility control and sex ratio of rat offspring. *J Babol Univ Med Sci* 2014;16(4):43-9. [in Persian]
- 8.Kazemi P, Jowhary H, Sharifi E, Zeraatpishe A. Androgenic Effect of *Origanum vulgare* L.spp viride extract on Hormone Level of Pituitary- gonadal Axis in Mature Male Vistar Rats. *Arak Med Univ J* 2012;14(6):89-96.
- 9.Ghorbani Ranjbari A, Ghorbani Ranjbari N, Ghorbani Ranjbari Z, Jouibar F. Effect of intraperitoneal injection of extracts of *Origanum vulgare* on gonadotropin and testosterone hormones in mail Wistar rats. *J Babol Univ Med Sci* 2014;16(4):57-63. [in Persian]
- 10.Hemayatkah Jahromi V, Parivar K, Forozanfar M. The effect of cinnamon extract on spermatogenesis hormonal axis of pituitary gonad in mice. *Iran J Appl Animal Sci* 2011;1(2): 99-103.
- 11.Hosseini SE, Mehrabani D, Razavi FS, RafieiRad M. Effect of palm pollen aqueous extract on the sex ratio of offspring in mice strain BALB/c. *Yafteh, J Lorestan Univ Med Sci* 2013;15(2):121-8. [in Persian]
- 12.Hassan AM, Abdel-Wahhab MA. Antioxidant effect of parsley and panax ginseng extract standardized with ginsenosides Rg3 against alteration induced in reproductive functions in male mice. *The Egyptian J Hosp Med* 2006;22:60-72.
- 13.Patil RB, Vora S R, Pillai MM. Spermatogenic activity of dietary antioxidant in oxidatively stressed mice. *J Cell Tissue Res* 2008;8(3):1519 -24.
- 14.Yousofi A, Daneshmandi S, Soleimani N, Bagheri K, Karim H. Immunomodulatory effect of Parsley (*Petroselinum crispum*) essential oil on immune cells: Mitogen-activated splenocytes and peritoneal macrophages . *Immunopharmacol Immunotoxicol* 2012;34(2):303-8.
- 15.Saeidi J, Bozorgi H, Zendehdel A, Mehrzad J. Therapeutic effects of aqueous extracts of *Petroselinum sativum* on ethylene glycol-induced kidney calculi in rats. *Urol J* 2012;9(1):361-6.
- 16.Wong RYY, Kitts D. Studies on the dual antioxidant and antibacterial properties of parsley (*Petroselinum crispum*) extracts. *Food Chem* 2006;97(3):505-15.
- 17.Sanocka D, Kurpisz M. Reactive oxygen species and sperm cells. *Reprod Biol Endocrinol* 2004;2:12.
- 18.Bastamoor F, Hosseini SE, Sadeghi HA. The *Petroselinum crispum* L. hydroalcoholicextract effects on pituitary-gonad axis in adult rats. *Armaghane-danesh Yasuj Univ Med Sci* 2014;19(4):305-13. [in Persian]
- 19.Bakkali F, Averbeck S, Averbeck D, Idaoman M. Biological effects of essential oils. *Food Chem Toxicol* 2008;46(2):446-75.

- 20.Van Meeuwen JA, Korthagen N, De Jong PC, Piersma A, Van den Berg M. Antiestrogenic effects of phytochemicals on human primary mammary fibroblasts, MCF-7 cells and their co-culture. *Toxicol Appl Pharmacol* 2007;221(3):372-83.
- 21.Nikravesh MR, Jalali M, Mohammadi S. Effects of crude onion extract on murine testis. *J Reprod Infertil* 2009;10(4):239-44.
- 22.Modaresi M, Mesripour M, Asadi M, Hamedanian MK. The effect of Saffron extract on testis tissue. *Iran J Med Aromatic Plants* 2008;24(2):237-43.
- 23.Walczak-Jedrzejowska R, Wolski JK, Slowikowska-Hilczer J. The role of oxidative stress and antioxidants in male fertility. *Cent European J Urol* 2012;66(1):60-7.
- 24.Li Z, Lin Q, Liu R, Xiao W, Liu W. Protective effects of ascorbate and catalase on human spermatozoa during cryopreservation. *J Androl* 2010;31(5):437-44.
- 25.Park NC, Park HJ, Lee KM, Shin D. Free radical scavenger effect of rebamipide in sperm processing and cryopreservation. *Asian J Androl* 2003;5(3):195-201.