

اندازه طبیعی رحم در سنین باروری

(بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل، ۷۹-۱۳۷۸)

دکتر صدیقه اسماعیلزاده^{۱*}، دکتر محمود حاجی احمدی^۲، دکتر نازیلا رضایی^۳

۱- استادیار گروه زنان دانشگاه علوم پزشکی بابل، ۲- عضو هیأت علمی گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی بابل، ۳- پزشک عمومی

سابقه و هدف: روشهای مختلفی جهت تعیین اندازه رحم از جمله روش بی خطر سونوگرافی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. این مطالعه اندازه طبیعی رحم خانمهای سنی باروری بابل را با استفاده از سونوگرافی مورد بررسی قرار می‌دهد.

مواد و روشهای: این مطالعه (توصیفی - تحلیلی) مقطعی بین سالهای ۱۳۷۸-۷۹ در بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل انجام گرفت. ۲۲۱ زن ۱۵-۴۵ سال که هیچگونه یافته غیرطبیعی در آناتومی رحم و پاتولوژی لگنی و همچنین خونریزی غیرطبیعی رحمی نداشتند، بررسی شدند. اندازه‌های رحمی با استفاده از دستگاه اولتراسونوگرافی شکمی Real - time تعیین گردید.

یافته‌ها: متوسط اندازه‌های رحمی در زنان بطور کلی $72/8 \times 42/8 \times 32/4$ mm و در زنان نولی پار $86/6 \times 49/6 \times 40/6$ mm و در مولتی پار $43/1 \times 51/8 \times 7/4$ mm بود. متوسط سنی زنان $31/7 \pm 9/6$ سال، BMI $24/7 \pm 4$ کیلوگرم بر متر مربع بود. بین اندازه‌های رحمی و پاریتی و نیز سن زنان بستگی معنی‌دار مستقیمی دیده شد ($p < 0.05$) ولی اندازه رحم با BMI ارتباط معنی‌داری نداشت.

نتیجه‌گیری: طبق بررسی انجام شده اندازه‌های طبیعی رحم در خانمهای سنین باروری نسبت به سایر مطالعات در مناطق دیگر بیشتر است و آگاهی از اندازه‌های طبیعی رحم، توانایی تشخیص بیماریهای مختلف رحم را با استفاده از سونوگرافی که وسیله‌ای رایج جهت بررسی رحم می‌باشد، امکان‌پذیر می‌سازد.

واژه‌های کلیدی: اولتراسونوگرافی، اندازه رحمی، سنین.

مقدمه

میوم رحمی، آدنومیوز، حاملگی و آنومالیهای رحمی را تعیین نمود(۲). جهت تعیین اندازه‌های رحم می‌توان از سونوگرافی واژینال یا شکمی کمک گرفت. با یک مثانه پر، تمام ارگانهایی که باید مورد بررسی قرار گیرد، در عمق ده سانتی متری قرار دارند و اسکن Real time بهترین انتخاب برای بررسی سونوگرافی می‌باشد(۳). اندازه رحم توسط سه بعد تخمین زده می‌شود: ۱- طول: از فوندوس تا سوراخ خارجی سرویکس ۲- قطر قدامی - خلفی: حداقل اندازه در برش

دانستن ابعاد طبیعی رحم برای ارزیابی سلامت زنان و پیش‌بینی بسیاری از بیماریها جایگاه خاصی دارد. سونوگرافی با مزایای آن شامل عدم اشعه، کاربرد آسان، توانایی اسکن در مقاطع مختلف و هزینه نسبتاً ارزان و بکارگیری آن در علم بیماریهای زنان تا حد زیادی متخصصین این رشته را در راه رسیدن به این هدف باری نموده است(۱). امروزه با داشتن معیارهای مشخص اندازه‌ها در سونوگرافی در سنین مختلف می‌توان بروز بعضی از بیماریها مثل

توده عضلانی بدن (BMI) بر اساس فرمول تقسیم وزن به کیلوگرم بر مجدور قد به متر مربع (۹) بدست آمد و بیماران براساس kg/m^2 بدست آمده به سه گروه مجزا در آمدند. گروه اول با $\text{BMI}=25-29/99 \text{ kg}/\text{m}^2$ ، گروه دوم با $\text{BMI}=20-24/99 \text{ kg}/\text{m}^2$ و گروه سوم با $\text{BMI}\geq 30 \text{ kg}/\text{m}^2$ بودند. بیماران توسط یک سونوگرافیست HIMADZU و با استفاده از دستگاه سونوگرافی M.Mode مدل با قدرت MHZ ۳/۵ سونوگرافی شدند.

اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماری SPSS با آزمونهای آماری T-test، ضریب همبستگی پیرسون و ANOVA و آنالیز کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها

طبق مطالعه حاضر از ۲۳۱ خانم مراجعه کننده، ۵۴ نفر (۲۳/۴٪) نولی‌پار، (۷۶/۶٪) مولتی‌پار بودند و متوسط پاریتی $86/6\times49/6\times40/6 \text{ mm}$ بود و متوسط اندازه‌های رحمی $27\pm2/4$ بدست آمد. براساس آزمون پیرسون بین اندازه‌های رحمی و پاریتی همبستگی معنی‌داری وجود داشت ($p<0.05$) (جدول ۱).

جدول ۱. اندازه‌های رحمی ۲۳۱ خانم سالم سنتین ۴۵-۱۵ سال طی سالهای ۱۳۷۸-۷۹ به تفکیک تعداد زایمان

| | پاریتی | مولتی‌پار | نولی‌پار | ابعاد رحم (mm) |
|--------------|--------------|----------------|-------------------------|----------------|
| $90/8\pm1/1$ | $72/8\pm1/3$ | Mean±SE | | طول |
| $51/7\pm0/7$ | $42/8\pm1/2$ | Mean±SE | قطر قدامی - خلفی | |
| $43/1\pm0/8$ | $32/4\pm0/1$ | Mean±SE | | پهنا |

$p=0/000$

در بررسی انجام شده متوسط سنی بیماران $31/7\pm9/6$ سال بود براساس آزمون پیرسون بین سن و اندازه‌های رحمی همبستگی معنی‌دار مستقیمی وجود داشت ($p<0.05$). همچنین براساس آزمون کوواریانس بین گروه‌های سنی و اندازه‌های رحمی و نیز پاریتی ارتباط معنی‌داری وجود داشت ($p<0.05$) ولی بین گروه‌های سنی و BMI ارتباط معنی‌داری وجود نداشت (جدول ۲).

طولی - میانی جسم رحم، سپس درجه قدامی - خلفی، پروب را درجه تغییر مکان می‌دهیم و قطر عرضی ارزیابی می‌شود(۳). پهنا: حداقل اندازه در برش عرضی فوندوس رحم (۴۵). اندازه و شکل رحم بطور مشخص با سن و سابقه مامائی تغییر می‌کند. در جنین، رحم تا سه ماهه اول بطور ثابت رشد می‌کند بعد از آن بعلت افزایش استروژن مادری، رشد رحم تشدید می‌شود. بالاصله بعد از زایمان، بعلت قطع استروژن مادر، رشد رحم کم می‌شود. در زمان بلوغ که ترشحات تخدمان شروع می‌شود، بزرگ شدن ابعاد رحم همراه با اولین نشانه‌های بلوغ مجدد شروع می‌شود، در این زمان رحم به شکل گلابی در می‌آید. در طول زندگی تغییرات رحم بیشتر ناشی از تغییرات لایه عضلانی غالباً در حجم است(۶) و با هر حاملگی جسم و فوندوس رحم ضخیم‌تر می‌شود. بعد از یائسگی جسم و فوندوس رحم چروکیده و به حالت قبل از بلوغ برگشت می‌کند بطوریکه در یک خانم مسن در حد یک فنجان کوچک بالای سرویکس لمس می‌شود. طول رحم در ۲-۸ سالگی کمتر از ۳۵ میلیمتر و قطر قدامی - خلفی ۱۰ میلیمتر است (۷ و ۸). در سنتین باروری طول رحم بیشتر از ۱۰ سانتیمتر غیرطبیعی تلقی می‌شود(۸). از آنجا که معیارهای رشد مثل قد، وزن و سایر مشخصات جسمی تحت تأثیر عوامل نژادی، ارثی، محیطی و تغذیه‌ای قرار می‌گیرد بر آن شدیدم تا حدود طبیعی رحم در زنان این منطقه مشخص گردد زیرا ابعاد خارج از این حدود می‌تواند بیانگر ضایعات پاتولوژیک باشد.

مواد و روشها

این مطالعه (توصیفی - تحلیلی) مقطعی در سال ۱۳۷۸-۷۹ در بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل انجام گرفت. جمعیت مورد مطالعه، ۲۳۱ خانم سالم در سنتین باروری ۱۵-۴۵ سال می‌باشند و افراد با آنatomی غیرطبیعی رحمی، پاتولوژی لگنی و خونریزی‌های غیرطبیعی رحمی از مطالعه خارج شدند. در اندازه‌گیری رحم از طریق سونوگرافی فاکتورهایی مثل فشار ارگانهای اطراف و زمان قاعدگی لحظه شد. اندازه‌های رحم، قد، وزن، پاریتی و سن مراجعه کنندگان ثبت گردید. بیماران براساس سن به سه گروه (۱۵-۲۴، ۲۵-۳۴، ≥ 35 سال) و بر اساس پاریتی بیماران به دو گروه نولی‌پار (حداقل یک زایمان) و مولتی‌پار (بیش از یک زایمان) تقسیم شدند. اندکس

در خانمهای نولی پار $70 \times 40 \times 40$ mm (۲) و طبق مطالعه Waldroup در سال ۱۹۹۷، اندازه های رحم در خانمهای نولی پار $80 \times 30 \times 55$ mm (۴) و طبق مطالعه Sanders و Wilson در سال ۱۹۹۱ اندازه های رحم در خانمهای نولی پار $40 \times 40 \times 60-90$ mm (۷) بود که نشانگر تفاوت واضحی می باشد.

همچنین طبق بررسی Macdonald Cunningham و همچنین طبق بررسی Cunningham در خانم نولی پار $9-10$ cm ارزیابی شد (۱۰) که با این مطالعه مشابهت دارد. از آنجا که ابعاد گزارش شده در منابع دیگر بر اساس بررسیهای انجام شده در آن مناطق بوده و این اندازه می تواند تحت تاثیر عوامل نژادی، ارثی، محیطی و تقاضه ای قرار بگیرد، این تغییرات می تواند بعلت شرایط خاص کشور ما باشد. همچنین بین اندازه متوسط رحمی در خانم مولتی پار و نولی پار اختلاف واضحی وجود دارد که دلالت بر تاثیر زایمان در اندازه های رحم می باشد که در مطالعات انجام شده توسط Liu و Cunningham در سال ۱۹۹۷ تایید می شود (۱۰).

سن متوسط بیماران $31/7 \pm 9/6$ سال بود. بین سن و سایز های رحمی همبستگی معنی دار مستقیمی وجود داشت که مطابق با مطالعه انجام شده توسط Waldroup و Liu در سال ۱۹۹۷ است که این می تواند بعلت تغییرات ترشح استروژن توسط تخدمان در طول دوران زندگی یک خانم باشد.

رشد مجدد رحم در بلوغ با ترشحات تخدمان شروع می شود و در سنین باروری ادامه می باید و در سنین یائسگی رشد متوقف و بعد از یائسگی جسم رحم به حالت چروکیده و بشکل قبل از بلوغ برمی گردد (۴)، که مؤید مطالعه حاضر نیز است. در بررسی حاضر متوسط انداکس توده بدن $24/7 \pm 4$ kg/m² بود که بین BMI و سایز رحمی همبستگی معنی داری وجود نداشت.

همچنین $48/8\%$ موارد $BMI=20-24/99$ kg/m² داشتند و $39/9\%$ موارد $BMI=25-29/99$ kg/m² و $11/3\%$ موارد $BMI \geq 30$ kg/m² بودند در صورتی که در مطالعه انجام شده توسط Spiroff و Galass BMI متوسط افراد $26/36$ kg/m² و $10-12\%$ افراد $BMI=20-24/99$ kg/m² داشتند (۱۱). در موارد $BMI \geq 30$ اندازه های رحمی $86/5 \times 49/9 \times 40/3$ mm بود و در افراد $BMI=25-29/99$ kg/m² و در افراد با $87/3 \times 39/9 \times 49/2$ mm بود.

جدول ۲. میانگین اندازه های رحمی در ۲۳۱ خانم سالم سنین ۱۵-۴۵ سال طی سالهای ۱۳۷۸-۷۹ به تفکیک گروه های سنی

| سن | طول | قطر قدامی-خلفی | پهنا | ابعاد رحمی |
|-----------|------------------|------------------|-----------------|------------|
| | Mean±SE | Mean±SE | Mean±SE | Mean±SE |
| ۱۵-۲۴ | $35/04 \pm 11/1$ | $77/11 \pm 11/9$ | $43/60 \pm 8/4$ | |
| ۲۵-۳۴ | $39/89 \pm 8/9$ | $85/74 \pm 14$ | $50/04 \pm 9/1$ | |
| ≥ 35 | $44/87 \pm 9/1$ | $93/70 \pm 15$ | $52/90 \pm 9/5$ | |

متوجه وزن بیماران $65/5 \pm 10/5$ کیلوگرم و متوجه قد بیماران $162/9 \pm 5/9$ سانتیمتر و متوجه انداکس توده عضلانی بدن $BMI=20-24/99$ kg/m² بود. $24/7 \pm 4$ افراد $BMI=25-29/99$ kg/m² و $11/3\%$ از آنها $BMI \geq 30$ kg/m² داشتند بین اندازه های رحمی و BMI معنی داری وجود نداشت (جدول ۳).

جدول ۳. اندازه های رحمی ۲۳۱ خانم سالم سنین ۱۵-۴۵ سال طی سالهای ۱۳۷۸-۷۹ به تفکیک انداکس توده عضلانی (BMI)

| B.P.value | BMI kg/m ² | طول | قطر قدامی-خلفی | پهنا | ابعاد رحمی |
|------------|-----------------------|----------------|----------------|---------|------------|
| | Mean±SE | Mean±SE | Mean±SE | Mean±SE | Mean±SE |
| $20-24/99$ | $86/5 \pm 1/5$ | $49/9 \pm 0/0$ | $40/3 \pm 0/9$ | | |
| $25-29/99$ | $87/3 \pm 1/9$ | $49/2 \pm 1/1$ | $39/9 \pm 1/2$ | | |
| ≥ 30 | $88/8 \pm 2/6$ | $49/3 \pm 2$ | $44/5 \pm 2/6$ | | |
| P.value | 0/787 | 0/148 | 0/882 | | |

بحث

براساس مطالعه حاضر، متوسط اندازه های رحم $86/6 \times 40/6$ mm بود که با اندازه های موجود در مطالعه Warwick و Banister در سال ۱۹۸۹ که $75 \times 25 \times 50$ mm بود، متفاوت می باشد (۹). همچنین اندازه های بدست آمده در خانمهای نولی پار $72/8 \times 42/8 \times 32/4$ mm و مولتی پار $90/8 \times 51/7 \times 43$ mm بود که طبق مطالعه Clifford و Holt در سال ۱۹۹۴ اندازه های رحم

دیگر بوده است و اندازه‌گیری سونوگرافیک رحم در تعیین پاتولوژیهای این اندام در مقایسه با اندازه نرم ال در همان منطقه بالارزش می‌باشد.

$BMI \geq 30$. $88/8 \times 44/5 \times 49/3$ mm بود تاکنون، مطالعه‌ای براساس ارتباط اندرکس توده بدن و اندازه‌های رحم در چند سال اخیر صورت نگرفت. در بررسی انجام شده متوسط سایز رحم بیشتر از مناطق



References

1. Timor Tritsch IE, Monteagudo A, Brown GM. Endovaginal sonographic evaluation of the obstetrics & gynecology patient In: Callen PW, Ultrasound in obstetrics and gynecology, 3rd ed, Philadelphia W.B. Saunders 1994; p: 5.
2. Holt SC, Levi CS, Lyons EA. Normal anatomy of the female pelvis In: Callen PW, Ultrasonography in obstetrics and gynecology, 3rd ed, Philadelphia, W.B Saunders 1994; pp: 548-68.
3. Berman MC, Kawai D. Principles of scanning technique in obstetrics & gynecology ultrasound In: Berman MC, Cohen HL. Diagnostic medical sonography , 2nd ed. Philadelphia, Lippincott 1997; p: 3.
4. Waldroup L, Liu JB. Sonographic anatomy of the female pelvis In: Berman MC, Cohen HL. Diagnostic medical sonography , 2nd ed, Philadelphia, lippineott 1997; pp: 51-9.
5. Timor Tritsch IE, Moteagudo A. Scanning technique in obstetrics & gynecology, Clinical Obstetrics & Gynecology Journal 1996; 39(1): 167-74.
6. Kurtz AB, Rifkin MD. Normal anatomy of the female pelvis In: Sanders RC, James AE, eds. The principles and practice of ultrasonography in obstetrics & gynecology 3rd ed, New York, Appelton Century Crofts 1985; p: 34.
7. Sanders RC. Clinical sonography, 2nd ed, Boston, Little Brown 1991; pp: 45-6.
8. Grunfeld L. The uterus and endometrium clinical obstetrics & gynecology Journal 1996; 39(1): 175-87.
9. Warwick W, Banister D. Gray's anatomy, 37 th ed London, Churchill Livingston 1989; pp: 1440-42.
10. Cunningham FG, Macdonald PC, Gant NF, et al. Williams obstetrics 2 th ed, London Appleton & lange 2001; pp: 43-47.
11. Spiroff L, Galass RH. Clinical gynecologic endocrinology and infertility, 6th ed, Philadelphia Lippincott 2001; p: 781.