

بررسی توزیع فراوانی عوامل باکتریال سپتیسمی نوزادان و تعیین مقاومت دارویی آنها نسبت به آنتی بیوتیکها (همدان، ۱۳۷۷-۷۸)

دکتر رسول یوسفی مشعوف *

دانشیار گروه پاتوبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی همدان

سابقه و هدف: سپتیسمی یکی از شایعترین علل مرگ و میر نوزادان در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما می باشد. هدف از این بررسی، شناسایی شایعترین عوامل باکتریایی ایجاد گشته سپتیسمی نوزادان، تعیین مقاومت دارویی باکتریایی ایزوله شده و بررسی سایر عوامل زمینه ساز سپتیسمی در بخش نوزادان بیمارستانها می باشد.

مواد و روشها: در یک مطالعه مقطعی که در بیمارستان کودکان قائم همدان از اردیبهشت ماه ۷۷ لغاًیت مهر ۷۸ انجام گرفت، کشت خون ۶۲۰ نوزاد مشکوک به سپتیسمی مورد بررسی قرار گرفت. ضمناً ارتباط عفونت خونی نوزادان با وزن، جنس و سابقه پستری نیز مورد بررسی قرار گرفتند. جهت تعیین مقاومت دارویی سوشهای ایزوله شده، از روش انتشار در آگار (کربی - بانر) استفاده گردید.

یافته ها: از مجموع ۶۲۰ مورد کشت خون انجام شده، ۱۰۴ مورد ۱۶/۸٪ کشت مثبت باکتریایی بdst است آمد که شایعترین عوامل جدا شده برتریب عبارت بودند از: پسودوموناس ۹/۲٪، کلیسیلا ۲۵٪، استافیلوکوک ارتوس ۱۴/۲٪، اشريشیاکلی ۱۲/۵٪، استافیلوکوک اپیدرمیدیس ۷/۷٪ و سایر باکتریها ۹/۶٪. بیشترین خطر عفونت در نوزادان با وزن ۱۵۰۰-۱۰۰۰ گرم به میزان ۸/۲۰٪ بوده است. از نظر حساسیت آنتی بیوتیکی در آزمایشگاه (*In vitro*) مؤثرترین آنتی بیوتیکها در مورد باکتریهای گرم منفی و گرم مثبت به ترتیب سپرروفلوکسازین و سفتی زوکسیم می باشد.

نتیجه گیری: سپتیسمی هنوز مسئله عمدی در بخش نوزادان است و بایستی تمهیمات لازم در پیشگیری آن اندیشیده شود.

واژه های کلیدی: سپتیسمی، عوامل باکتریال، نوزادان، مقاومت دارویی.

مقدمه

۵۰ درصد می باشد (۱ و ۲). نظر به اینکه سیستمهای دفاعی نوزاد هنوز به خوبی رشد و تکامل نیافته، لذا در مواجهه با انواع میکروارگانیسمها قدرت دفع آنها را نداشته و امکان انتشار عفونت به سایر نقاط بدن وجود دارد. با توجه به اینکه حداکثر مرگ و میر اطفال زیر

سپتیسمی یکی از مهمترین علل مرگ و میر نوزادان خصوصاً نوزادان نارس می باشد. شیوع آن در کشورهای پیشرفته ۱-۸ مورد در هر ۱۰۰۰ نوزاد تولد شده می باشد، در حالیکه در کشورهای فقیر و در حال توسعه تقریباً ده برابر بیشتر گزارش می گردد و میزان مرگ و میر بین ۱۵ تا

EPi-6 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت انجام کشت با رعایت اصول صحیح به میزان ۰-۱۰ میلی لیتر خون توسط پزشک معالج یا پرستاران بخش گرفته شده و در شیشه‌های کشت خون استاندارد Brain heart infusion Trypticase soy broth و یا broth که حاوی ماده ضد انعقاد سیترات می‌باشد، تخلیه شد.

محیط‌های کشت خون به مدت حداقل یک هفته در حرارت ۳۷ درجه سانتیگراد نگهداری و در فواصل ۲۴ و ۷۲ ساعت و یک هفته بعد از آنها کشت مجدد تهیه می‌گردید. جهت انجام این کار مقداری از مایع محیط کشت حاوی خون را به محیط‌های بلا داگار، انوزین متیلن بلو و شکلات آگار منتقل نموده و به مدت ۲۴-۴۸ ساعت انکوباسیون نموده و پس از این مدت در صورت رشد کلثی‌های باکتریایی بر روی محیط‌های جامد مذکور، با توجه به مورفولوژی کلثی‌ها و مورفولوژی باکتریها در اسمیر رنگ آمیزی شده، مناسب با آنها از محیط کشت‌های تشخیص افتراقی نظیر محیط‌های SIM، TSIV، سیمون سیترات، اوره و تست‌های اندول، MR-VP، برای تشخیص باکتریهای گرم منفی روده‌ای و از تست‌های کاتالاز و کواگلاز جهت تشخیص استافیلوکوک‌ها، از دیسک‌های اپوشین جهت تشخیص پنوموکوک و با سیتراسین جهت تشخیص استریتوکوک بتا همولیتیک گروه A استفاده گردید (۵۰).

همزمان با تشخیص افتراقی باکتریهای جدا شده از کشت‌های مثبت جهت تعیین حساسیت باکتریها نسبت به داروهای ضد میکروبی از روش کربی-بائز استفاده گردید (۹). تعداد ۸ عدد دیسک آنتی بیوتیک رایج ساخت شرکت پادتن طب مورد استفاده قرار گرفته بود که عبارت بودند از:

سیپروفلوکسائین، آمیکاسین، جستامایسین، سولفامتوکسازول، سفالکسین، سفتی زوکسیم، آموکسی سیلین و آمپی سیلین.

یکسال در دوران نوزادی اتفاق می‌افتد، بنابراین تشخیص به موقع نوزاد مبتلا به این بیماری با توجه خاص به علامت بالینی و آزمایشگاهی و همچنین شروع سریع درمان مناسب آن، مرگ و میر و عوارض ناشی از این بیماری را تحدی زیادی کاوش می‌دهد. با توجه به اینکه شیوع سپتیسمی نوزادان از یک بیمارستان به بیمارستان دیگر و از یک اجتماع نسبت به اجتماع دیگر متغیر بوده و بستگی به شرایطی دارد که زمینه ابتلا به سپتیسمی را فراهم می‌سازد. اطلاع و شناخت شایعترین باکتریهای عامل سپتیسمی نوزادان و آگاهی از حساسیت آنها نسبت به داروهای ضد میکروبی در درمان نوزادان مشکوک به سپتیسمی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد (۳۷).

در حال حاضر بهترین راه جهت شناسایی عوامل ایجاد کننده سپتیسمی، کشت خون به دفعات و با فاصله زمانی مشخص و از وریدهای مختلف بیمار می‌باشد، تا با انجام آزمایشات اختصاصی میکروبیولوژی بتوان سپتیسمی را در این افراد تشخیص داد.

با توجه به اهمیت موضوع این مطالعه به بررسی شایعترین عوامل باکتریایی سپتیسمی نوزادان، تعیین مقاومت دارویی باکتریهای ایزو له شده و بررسی سایر عوامل ایجاد کننده سپتیسمی در مراجعین به تنها بیمارستان کودکان شهر همدان می‌پردازد.

مواد و روشها

این مطالعه از نوع مقطعی بوده و جامعه آماری آن را نوزادانی تشکیل می‌دهند که سن آنها کمتر از یک ماه بوده و به علت بیماری، به بیمارستان کودکان مراجعه و با تشخیص پزشک مربوطه در بخش نوزادان بستری شدند. در طی یکسال و نیم از اردیبهشت ماه ۷۷ لغایت مهر ۷۸ تعداد ۶۲۰ نوزاد مشکوک به سپتیسمی از نظر کشت خون، توزیع وزنی، توزیع جنسی و سابقه بستری مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات ضروری بیماران در پرسشنامه تنظیمی درج و سپس توسط نرم افزار آماری

این میزان در نوزادان کمتر از ۱۰۰۰ گرم ۱۰/۶٪، ۲۰۰۰-۱۵۰۰ گرم به میزان ۲۷/۹٪، ۲۵۰۰-۲۰۰۰ گرم ۱۶/۳٪ و بالاتر از ۲۵۰۰ گرم ۱۸/۳٪ بوده است. همچنین از مجموع ۶۲۰ نوزاد مورد مطالعه ۳۳۱ نوزاد (۴/۵۳٪) از جنس مؤنث بودند. جنس ذکر و ۲۸۹ نوزاد (۶/۴۶٪) از جنس مؤنث بودند. از ۱۰۴ نوزاد مبتلا به سپتیسمی نیز ۷/۵٪ ذکر و ۳/۴۲٪ مؤنث بودند. از نظر مدت زمان بستری نوزادان در بخش مربوطه، ۲/۱۷٪ کمتر از ۳ روز، ۱/۳۴٪ بین ۳ تا ۵ روز، ۰/۳۲٪ بین ۵ تا ۸ روز و ۰/۱۱٪ بیشتر از ۸ روز بستری بودند و مدت زمان بستری شدن ۰/۴٪ از نوزادان نیز مشخص نگردید. از ۱۰۴ نوزاد مبتلا به سپتیسمی، ۰/۵۶٪ نوزاد (۷/۰۵٪) بطور همزمان دارای عفونتهای دیگری مانند پنومونی، متئریت، عفونت ادراری و عفونت پوستی - مخاطی بوده‌اند.

نتایج بررسی مقاومت دارویی ارگانیسم‌های جدا شده نسبت به آنتی بیوتیک‌های مورد آزمایش، در جدول ۲ نشان داده شده است.

نتایج نشان می‌دهد بیشترین مقاومت دارویی (۰/۵۲٪) در گونه‌های پسودومonas و کمترین مقاومت دارویی (۱/۳۲٪) در گونه‌های اشریشیاکلی مشاهده گردید. گونه‌های کلبسیلا، اشریشیاکلی و استافیلوکوک اپیدرمیدیس هیچگونه مقاومتی نسبت به سپیروفلوكسازین نداشتند. گونه‌های استافیلوکوک اورئوس ۰/۶٪ و پسودومonas تنها ۰/۷٪ نسبت به این آنتی بیوتیک مقاومت نشان دادند. گونه‌های استافیلوکوک (اورئوس و اپیدرمیدیس) هیچگونه مقاومتی به سفتیزوکسیم نشان ندادند و به غیر از پسودومonas سایر گونه‌های آزمایش شده از مقاومت کمی نسبت به این آنتی بیوتیک برخوردار بودند. کلیه گونه‌های مورد آزمایش نسبت به آنتی بیوتیک‌های آمپیسیلین، آموکسیسیلین و سولفامتوکسازول مقاومت نسبتاً بالایی نشان دادند بطوریکه گونه‌های پسودومonas و اشریشیاکلی نسبت به آمپیسیلین ۱۰۰٪ مقاوم بودند.

یافته‌ها

از مجموع ۶۲۰ نوزاد مشکوک به سپتیسمی که به تشخیص پزشک متخصص اطفال کشت خون تهیه شده بود، ۱۰۴ نوزاد (۱۶/۸٪) دارای کشت مثبت باکتریایی بودند که از این تعداد ۷۴ مورد (۷۱/۲٪) باکتریهای گرم منفی و ۳۰ مورد (۲۸/۸٪) باکتریهای گرم مثبت ایزوله گردید، شایعترین باکتریهای گرم منفی ایزوله شده عبارتند بودند از: استافیلوکوک اورئوس ۱۵ مورد (۴/۱٪)، استافیلوکوک اپیدرمیدیس ۸ مورد (۸/۷٪) و استرپتیکوک پنومونیه ۳ مورد (۹/۲٪). توزیع فراوانی سایر باکتریهای ایزوله شده از کشت خون نوزادان مشکوک به سپتیسمی در جدول ۱ نشان داده شده است.

جدول ۱. عوامل باکتریال سپتیسمی جدا شده از کشت خون

نوزادان (بیمارستان کودکان شهر همدان، ۷۸-۱۳۷۷).

نوع ارگانیسم	تعداد	درصد
پسودومonas آتروژینوزا	۲۸	۲۶/۹
کلبسیلا	۲۶	۲۵
استافیلوکوک اورئوس	۱۵	۱۴/۴
اشریشیاکلی	۱۴	۱۳/۵
استافیلوکوک اپیدرمیدیس	۸	۷/۷
استرپتیکوک پنومونیه	۳	۲/۹
سالمونلا	۳	۲/۹
آنتروکوک	۲	۱/۹
کورینه باکتریوم دیفتروئید	۱	۰/۹۶
آنتروباکتر	۱	۰/۹۶
پروتئوس	۱	۰/۹۶
نامشخص	۲	۱/۹
جمع	۱۰۴	۱۰۰

در مورد مشخصات وزنی نوزادانی که دارای سپتیسمی بودند، بیشترین خطر بروز عفونت در نوزادان با وزن بین ۱۰۰۰-۱۵۰۰ گرم به میزان ۸/۳۰٪ بوده است.

جدول ۲. توزیع فراوانی مقاومت دارویی باکتریهای ایزووله شده نسبت به آنتی بیوتیکهای رایج (همدان، ۷۷-۷۸)

آنتی بیوتیک *	تعداد درصد								
	تعداد درصد								
پسودوموناس	(۱۰۰)۲۸	(۹۳)۲۶	(۲۸)۸	(۶۱)۱۷	(۶۴)۱۸	(۵۰)۱۴	(۱۸)۵	(۷)۲	
کلپسیلا	(۹۶)۲۵	(۸۸)۲۳	(۸)۲	(۳۱)۸	(۵۴)۱۴	(۱۱)۳	(۱۱)۳	(۰)۰	
استافیلوکوک اورئوس	(۹۳)۱۴	(۷۳)۱۱	(۲۰)۰	(۸۷)۳	(۸۶)۱۳	(۱۳)۲	(۲۷)۴	(۶)۱	
اشریشیاکلی	(۱۰۰)۱۴	(۸۶)۱۲	(۷)۱	(۲۸)۴	(۳۶)۵	(۷)۱	(۰)۰	(۰)۰	
استافیلوکوک اپیدرمیدیس	(۷۵)۶	(۶۲)۵	(۰)۰	(۵۰)۴	(۵۰)۴	(۲۵)۲	(۱۲)۱	(۰)۰	

* CP= Ciprofloxacin , AN= Amikacin , GM= Gentamycin , SXT= Sulfamethoxazole , CF= Celphalexin ,

CT= Ceftizoxime , AMX= Amoxicillin , AM= Ampicillin

بحث

مناسب ضد عفونی در بخش نوزادان دقت لازم به خرج داده شود. از طرفی چون این نوزادان مدت طولانی تری در بیمارستان بستری می شوند، ممکن است در سیستم ایمنی آنها اختلال بوجود آمده و با تهیه مکانیکی و کاتتریزاسیون ناف، خطر انتشار عفونتهای بیمارستانی در آنها افزایش یابد. علاوه بر ارگانیسمهای پاتوژن، سایر ارگانیسمهای کم ویرولانس نیز می توانند در چنین محیط هایی سبب عفونت شوند (۱۳). بطور کلی در این بررسی باکتریهای گرم منفی (۷۱/۰٪) نسبت به باکتریهای گرم مثبت (۲۸/۸٪) نقش بیشتری در ایجاد سپتی سمی در نوزادان بستری شده داشته اند که این یافته ها در مقایسه با سایر مطالعات مشابه دارای تفاوت ها و شباهت هایی می باشد (۱۴-۱۷ و ۱۱-۱۲). در بررسی مشابهی که در گروه وزنی زیر ۲۵۰۰ گرم انجام گرفت، ۳۳٪ نوزادان مبتلا به سپتی سمی شده اند که علت ۵۶٪ موارد سپتی سمی، باکتریهای گرم مثبت (استافیلوکوک اورئوس و اپیدرمیدیس و آتروکوک) و ۲۵٪ گرم منفی روده ای ۱۳٪ قارچ بوده است (۱۰). در یک تحقیق دیگر که در کشور نیجریه بر روی میزان بروز سپتی سمی در نوزادان انجام گرفت (۱۵)، سهم باکتریهای گرم مثبت در ایجاد سپتی سمی در مجموع ۶۳٪ و استافیلوکوک اورئوس به

سپتی سمی بعنوان شایعترین عفونت بخش نوزادان در تمامی گروه های وزنی مخصوصاً نوزادان کم وزن از نظر راه های پیشگیری و درمانی نیاز به توجه ویژه ای دارد. مهم ترین منابع میکروبی از طریق وریدی و نافی بوده و علیرغم پیشرفت در روش های درمانی هنوز بعنوان یک مشکل مهم بخش های نوزادان بدليل افزایش امکان زنده ماندن نوزادان نارس و کم وزن بشمار می رود. میزان این عفونتها رابطه مستقیم با خردسالی نوزاد و مدت بستری دارد. شیوع عفونتهای فوق در نوزادان کمتر از ۱۵۰۰ گرم به ۲۰ تا ۳۳٪ می رسد (۱۰). در این مطالعه نوزادان با وزن بین ۱۵۰۰-۱۰۰۰ گرم بیشترین شانس ابتلا به سپتی سمی را داشتند (۳۰/۸٪) که مدت بستری آنها در بخش ویژه نوزادان بیش از سایر گروه های وزنی بوده است. بیشترین باکتری ایزووله شده از این گروه وزنی از نوع پسودوموناس آئروژینوزا بود که در اکثر مطالعات صورت گرفته (۱۱-۱۲) این باکتری به همراه استافیلوکوک اورئوس و اشريشياکللي بعنوان عامل عفونت های بیمارستانی شناخته شده اند. بنابراین احتمال بروز عفونت در این گروه سنی پس از بستری شدن در بیمارستان وجود دارد که این موضوع می تواند مورد توجه مسئولین محترم بیمارستانهای کودکان قرار گیرد تا در استفاده از شیوه های

این مطالعه و سایر مطالعات انجام شده در ایران این باکتریها گزارش نشده است (۱۴ و ۱۲) و علت آن بدرستی مشخص نشده است که آیا فقدان تکنیکهای لازم در این امر دخیل بوده است یا واقعاً این باکتریها در کشور ما شیوع ندارند.

از نظر بررسی مقاومت دارویی باکتریهای ایزوله شده در آزمایشگاه (Invitro)، مؤثربین آنتی بیوتیک برای باکتریهای گرم منفی بویژه کلبسیلا، اشریشیاکلی و پسودوموناس، آنتی بیوتیک سپروفلوکسازین و بعد از آن آمیکاسین و جنتامایسین بوده است؛ در حالیکه باکتریهای گرم مثبت (استافیلوکوک اورثوس و اپیدرمیدیس) نسبت به سفتی زوکسیم صدرصد حساسیت نشان دادند. با این حال این دسته از باکتریها نسبت به سپروفلوکسازین و آمیکاسین نیز حساسیت بسیار خوبی نشان دادند. اکثر باکتریهای جدا شده اعم از گرم مثبت یا گرم منفی نسبت به آمپی سیلین، آموکسی سیلین و سولفامتوکسازول مقاومت بالایی نشان دادند. با توجه به نتایج حساسیت باکتریهای جدا شده نسبت به آنتی بیوتیک های آزمایش شده نتیجه می گیریم که اکثر عوامل ایجاد کننده سپتی سمی نوزادان نسبت به جنتامایسین، آمیکاسین و سفتی زوکسیم از حساسیت مناسبی برخوردارند. البته اکثر باکتریهای ایزوله شده نسبت به سپروفلوکسازین کمترین مقاومت دارویی FDA از خود نشان دادند. اما با توجه به دستورالعمل استفاده از این آنتی بیوتیک ها برای استفاده از افراد کمتر از ۱۸ سال تأیید نشده است. کاربرد آنتی بیوتیک های وسیع الطیف، رشد فلور میکروبی طبیعی را مهار می کند و سبب رشد و تکثیر باکتریهای مقاوم می شود. بنابراین توصیه می شود جهت انتخاب آنتی بیوتیک، ضمن درخواست آنتی بیوگرام برای باکتری جدا شده، شروع درمان نوزاد مشکوک به سپتی سمی توصیه می شود مخلوطی از دو آنتی بیوتیک مثل سفالوسپورینهای نسل سوم (سفتی زوکسیم) با یک آمینو گلیکوزید (آمیکاسین) استفاده شود و سعی شود تغییر رژیم درمانی

نهایی ۸/۳۳٪ گزارش شده است و سایر باکتریهای گرم منفی عبارت بودند از کلبسیلا ۱۴٪، اشریشیاکلی ۷٪، اتریو باکتر ۵٪، پسودوموناس ۳٪ و سالمونلا، پروتئوس و سیترو باکتر هر کدام ۲٪. در مطالعه مشابه دیگری که در کشور اتریش صورت گرفت، میزان بروز سپتی سمی در نوزادان ۶٪ گزارش شده که سهم باکتریهای گرم منفی فقط ۴٪ می باشد. در حالیکه باکتریهای گرم مثبت بویژه استافیلوکوک کواگولاز منفی و استریپتوکوکهای گروه B بعنوان عامل اصلی ایجاد کننده سپتی سمی معرفی شده اند (۱۶). در مطالعه دیگر نیز استافیلوکوکها با فراوانی ۶۲٪ به عنوان شایعترین عامل اتیولوژیک سپتی سمی نوزادان گزارش شده است (۷) که با یافته های این مطالعه مغایرت دارد. با این حال در برخی دیگر از گزارشات باکتریهای گرم منفی بیش از باکتریهای گرم مثبت در ایجاد سپتی سمی نوزادان نقش داشته اند که با نتایج مطالعه حاضر تطابق دارد. در یک تحقیق مشابه باکتریهای گرم منفی بیش از ۷۰٪ بعنوان عامل اتیولوژی سپتی سمی نوزادان معرفی شده است که اشریشیاکلی ۵/۳۷٪، استافیلوکوک ۸/۲۰٪، پسودوموناس ۵/۱۲٪ بوده است (۱۷). همچنین در مطالعه دیگری که بر روی ۴۴ نمونه کشت خون نوزادان انجام گرفت، سهم باکتریهای گرم منفی ۹٪/۷۰٪ باکتریهای گرم مثبت ۱/۲۹٪ بوده است (۱). یافته های فوق حاکی از این مطلب می باشد که عوامل ایجاد کننده سپتی سمی نوزادان می توانند از یک منطقه به منطقه دیگر متفاوت باشد که به فاکتورهای متعددی از جمله مراقبتهای ویژه نوزادان، عفوتهای بیمارستانی، استفاده از آنتی بیوتیک های وسیع الطیف، گذاشتن کاتتر در رگها برای تغذیه وریدی، نارس بودن نوزاد، بستری درازمدت، کاهش سیستم ایمنی، استفاده از ساکشن ها و انکوباتورها و نحوه ضد عفونی وسایل و تجهیزات بخش نوزادان بستگی دارد. از نکات قابل ذکر دیگر اینکه استریپتوکوک گروه B و لیستریا از عوامل سپتی سمی نوزادان در آمریکا و اروپا و چین گزارش شده است (۱۸-۲۰). در حالیکه در

کننده‌های استاندارد و مؤثر، افزایش فضای فیزیکی برای هر تخت، مناسب بودن تعداد پرستاران نوزادان بیمار، مراقبت دقیق از بند ناف، مصرف آنتی‌بیوتیک مناسب در شروع درمان از بروز سپتیسمی نوزادان جلوگیری بعمل آورده شود.

بر مبنای نتایج کشت و آنتی‌بیوگرام باشد. در نهایت با این مطالعه می‌توان گفت که سپتیسمی هنوز یک مشکل جدی در بخش نوزادان است و بایستی با رعایت نکاتی چون شستن دقیق دستها، استفاده از وسایل یکبار مصرف، شناسایی حاملین عوامل پاتوژن، استفاده از ضدغوفونی

References

- Walckiers D, Van Iook F. Epidemiological study on neonatal septicemia and meningitis in Belgium. J Acta Clin Belg 1995; 50(6): 326-34.
- Remington C. Septicemia and meningitis, In: Remington C. Infectious diseases of the newborn infant, WB Saunders, 1995; (4): 835-90.
- Stanley GL, Pfaller NA, Mori M. Nasocomial gram negative blood stream isolates: a comparison of invitro antibiotic potency. J of Hospital Infection 1989; 14: 217-225.
- Oski F, De Angelis C, Feigin R, Warshaw J. Neonatal septicemia and meningitis ; Principles and practices. Pediatrics 1990; 36(5): 471-80.
- Jawwets E, Melnick L, Delberg A. Enteric gram negative rods (Enterobacteriaceas), In: Jawwets E, Melnick L, Delberg A. Principles if diagnostic Medical Microbiology. Applton and lange, 21st ed, 1995; 212-224.
- Forfar J, Ameil G. Septicemia and meningitis, In: Forfar HJ, Ameil G. Textbook of pediatrics, 3rd ed, Churchill Livingstone Company, 1984; 2: 1381-1402.
- Cologna M. Overview of nasocomial infections in a neonatal intensive care unit. J Rev Infect 1995; 14(2): 62-6.
- Finegold M, Baron E. Microorganisms encountered in blood, in: Finegold M, Baron E. Diagnostic Microbiology Bailey and scotts. 8th ed, Mosby Company, 1990; 197-213.
- Bauer AW, Kirby WM, Sherris JC, et al. Antibiotic susceptibility testing by a standardized single disk method, AM J Clin Patho 1996; 45:493-496.
- Kilieman RM, Clapp DW. Rational principles for immunoglobulin prophylaxis and therapy of Neonatal infections. Clin Prinatol 1991; 18: 303-17.
- Mccraken GH, Freji BJ. Bacterial and Viral infections of the Newborn, In: Avery G B (ed): Neonatology, 7th ed, Lippincott. Philadelphia, 1987; 917-929.
۱۲. معموری غع. بررسی عفونتهای میکروبی در بخش مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان قائم (عج)، مجله علمی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، ۱۵:۱۲۷۶ (۲و۳): ۱۱۸-۱۲۲.

13. Thompson PJ. Nasocomial Bacterial infections in VLBW infants. RUR J Pediatr 1992; 151-54.
۱۴. سمعانی هـ بررسی علل و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی باکتریهای ایجاد کننده سپسیس در نوزادان، مجله علمی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۷۶، ۱۵(۴): ۵۴-۱۵۱.
15. Ako Nai AK, Adejuyigbe EA, Ajayi FM, et al. The bacteriology of neonatal septicemia in Ile-ifé, Nigeria. J Trop Pediatr 1999; 45(3): 146-51.
16. Berger A, Salzer HR, Weninger M, et al. Septicemia in an Austrian neonatal intensive care unit: a 7 year analysis. Acta Paediatr 1998; 87(10): 1066-9.
17. Sanghri KP, Tudehope DL. Neonatal bacterial sepsis in a neonatal intensive care unit. Pediatr Child Health 1996; 32(4): 333-8.
18. Golden BA, Fletcher MA, Machdonald G. Acute infection in neonate, Neonatology ED. Lippincott Philadelphia, 1994; 4: 1082-1162.
19. Ho My, Wu CT, Ku YT, et al. Group B streptococcal infection in neonates: an 11 years review. 1999; 40(2): 83-6.
20. Nolla Salas J, Bosch J, Gasser I, et al. Perinatal listeriosis: a Population based multicenter study in Barcelona. Am J Perinatol 1998; 15(8): 461-7.