

## فراوانی بیماری ادرار شربت افرا در نوزادان بستری در بیمارستان کودکان امیرکلا (۱۳۹۰-۱۳۸۱)

یدالله زاهدپاشا<sup>۱</sup>، موسی احمدپور کچو<sup>(MD)</sup><sup>۱</sup>، مرتضی علیجانپور<sup>(MD)</sup><sup>۱</sup>، رضا بهمدی<sup>(MD)</sup><sup>۱</sup>، طاهره جهانگیر<sup>(BSc)</sup><sup>۱</sup>

- ۱- مرکز تحقیقات بیماری‌های غیرواگیر کودکان امیرکلا، دانشگاه علوم پزشکی بابل  
۲- دانشگاه علوم پزشکی بابل

دریافت: ۹۲/۸/۱۵، اصلاح: ۹۲/۶/۱۳، پذیرش: ۹۲/۵/۵

### خلاصه

**سابقه و هدف:** در تشخیص افتراقی نوزادان بستری با نشانه‌های سپسیس، بیماری‌های متابولیسم سرشی قرار دارند. بیماری ادرار شربت افرا یک بیماری نادر متابولیسم سرشی با توارث اتوژومال مغلوب و شیوع بالاتر در جوامع با ضریب درون همسری بالا است. این مطالعه به منظور تعیین فراوانی این بیماری بین نوزادان بستری طی مدت ۱۰ سال در بیمارستان کودکان امیرکلا استان مازندران، انجام شد.

**مواد و روشهای:** در این مطالعه توصیفی، پرونده نوزادان بستری شده با عالم غیر اختصاصی بیماری‌های متابولیسم سرشی که از نظر ابتلاء به این بیماریها طی سالهای ۱۳۸۱-۹۰ ارزیابی شده بودند، بررسی شد. نوزادانی که با توجه به سطح بالای اسیدهای آمینه شاخه دار در آنالیز کمی اسیدهای آمینه سرم و/یا ادرار با تشخیص بیماری ادرار شربت افرا تحت درمان قرار گرفته بودند، از نظر سن، جنس، رابطه خویشاوندی والدین، محل سکونت والدین، نشانه‌های بالینی منجر به بررسی نوزاد، نوع درمان انجام شده و پیامدهای بستری مورد بررسی قرار گرفتند.

**یافته‌ها:** از مجموع ۳۱۵۴ نوزاد بستری شده در این بیمارستان طی این دوره زمانی، ۱۶ مورد تشخیص بیماری ادرار شربت افرا داده شد (۵٪). با توجه به تعداد کل موالید استان طی زمان مطالعه (۴۲۷۴۲۰ نفر)، فراوانی مبتلایان در کل استان حداقل ۱/۲۶۷۱۴ تولد بود. برای درمان ۱۱ مورد (۶۹٪) این نوزادان علاوه بر درمان دارویی از تعویض خون با دو برابر حجم خون استفاده شد که در ۷۳٪ موارد (۸ مورد) منجر به کنترل بیماری و ترجیح نوزاد گشت.

**نتیجه‌گیری:** نتایج مطالعه نشان داد که فراوانی بیماری ادرار شربت افرا در منطقه مورد مطالعه زیاد است. اجرای برنامه غربالگری این بیماری برای نوزادان در این منطقه و انجام آزمونهای تشخیصی پره ناتال در خانواده‌های مبتلایان پشندهاد می‌شود.

**واژه‌های کلیدی:** نوزادان، بیماری ادرار شربت افرا، تعویض خون.

### مقدمه

دار در آنالیز کمی اسیدهای آمینه و یا افزایش دفع ادراری آلفا کتو و هیدروکسی اسیدها و اسیدهای آمینه شاخه دار مشخص می‌شود (۱). استفاده از تست غربالگری با اسپکترومتری توده ای باعث تشخیص سریع و قابل اعتماد تری برای کودکان مبتلایان شده است (۴). تشخیص پره ناتال برای موارد شدید بیماری با آنالیز آنزیمی سولهای آمینوتیک امکان پذیر است (۱). در درمان اورژانس نوزادان مبتلا به MSUD (Maple Syrup Urine Disease، MSUD) که سیستم عصبی به خطر افتاده است، تعویض خون، دیالیز صفائی و روش‌های مختلف دیالیز خونی، درمانهای اصلی هستند. از نظر تئوری تعویض خون برای برداشت متabolیت‌هایی که در کل آب بدن منتشر شده اند ناکافی است با این وجود این روش با حجم زیاد (۴-۵ برابر حجم خون) مدت هاست که بعنوان یک وسیله مؤثر شناخته شده است. با این وجود اثرات گذرا آن کاربرد این روش را محدود کرده است و باید همراه با روش‌های دیگر مثل دیالیز صفائی بکار رود و یا بصورت مکرر یا مداوم انجام شود (۵). بیماری‌های با توارث اتوژومال مغلوب در جوامع با ضریب درون

در بیماری ادرار شربت افرا به علت کمبود ارثی کمپلکس آلفا کتو اسید دهیدروژناتر باسته به تیامین، اسیدهای آمینه شاخه دار و مشتقان آلفا کتواسید و هیدروکسی اسید آنها و همچنین ال-آلایزولوسین در مایعات فیزیولوژیک افزایش می‌یابند (۱). افزایش ال-آلایزولوسین برای تشخیص بیماری ادرار شربت افرا پاتوگنومونیک و تشخیصی است (۲)، بیماری ادرار شربت افرا یک بیماری با توارث اتوژومال مغلوب است که از نظر تظاهرات بالینی به پنج صورت نوع کلایسک، نوع بینایینی، نوع متناوب، نوع پاسخ دهنده به تیامین و کمبود لیپوامید دهیدروژنات دیده می‌شود. بسیاری از مبتلایان به بیماری ادرار شربت افرا از نوع کلاسیک رنج می‌برند. مبتلایان به این نوع بیماری در دوره نوزادی با خوب شیر نخوردن و استفراغ ظاهر می‌یابند که در صورت عدم شروع درمان به سرعت به سمت لتاڑی، هایپوتونی/سققی عضلات و تشنج پیش می‌روند (۱). این نوزادان فقط در صورتی پیش آگهی قابل قبولی دارند که قبل از پنج روزگی تشخیص داده شده و درمان شوند (۳). تشخیص با پیدا کردن سطوح بسیار افزایش یافته اسیدهای آمینه شاخه

بررسی نوزاد، نوع درمان انجام شده و پیامدهای بسترهای مورد بررسی قرار گرفتند. امکان انجام اتوپسی در موارد منجر به فوت فراهم نبود. مواردی از تشخیص پره-ناتال یا بدون علایم بالینی وجود نداشت.

فرم اجازه کتبی والدین مبنی بر استفاده از اطلاعات پرونده در بررسی‌های تحقیقاتی در تمام پروندها موجود بود. فراوانی این بیماری با تقسیم نوزادان مبتلا به بیماری ادرار شربت افرا به کل نوزادان بسترهای شده در بیمارستان کودکان امیرکلا در طی فاصله زمانی انجام تحقیق محاسبه شد (۱۶).

همسری بالاتر شایعتر هستند. در یک مطالعه میزان کلی ازدواج فامیلی در ایران ۳۸/۶٪ و متوسط ضریب درون همسری ۰/۰۱۸۵ گزارش شده است (۶). این ضریب در کانادا ۰/۰۰۰۴ تا ۰/۰۰۰۸، در آمریکا ۰/۰۰۱ تا ۰/۰۰۵ و در عربستان سعودی ۰/۰۲۴ تعیین شده است (۷و۸). فراوانی بیماری ادرار شربت افرا در کل جهان حدود ۱ در ۱۸۵۰۰ تولد زنده است (۹و۱۰). در یک مطالعه در کشور پرتغال با استفاده از اسپکترومتری توده ای بروز ۱ در ۸۶۰۰ تولد زنده مشخص شده است که بالاتر از آمار جهانی است (۱۱). در جوامع با ضریب درون همسری بالا مثل متونیتها در پنسیلوانیا بروز این بیماری ۱ در ۲۰۰ تولد زنده نیز گزارش شده است (۱۲).

### یافته‌ها

از مجموع ۳۱۵۴ نوزاد بسترهای شده در بیمارستان کودکان امیرکلا طی سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۸۱، ۱۶ مورد مبتلا به بیماری ادرار شربت افرا تشخیص داده شدند که فراوانی ۰/۰۵٪ را مطرح می‌کنند (جدول ۱). محل سکونت والدین تمام این نوزادان در استان مازندران بود. با توجه اینکه تعداد کل مبتلین در استان مازندران طی این دوره زمانی ۴۳۷۴۲۰ نفر بوده است (۱۵)، این تعداد مبتلایان، حداقل ۱ در ۲۶۷۱۴ نوزاد متولد شده در این استان را تشکیل داده است.

از میان بیماران ۴ نفر پسر و بقیه دختر بودند. طی مدت ۱۰ سال انجام شد. رابطه خوبی‌باشد داشتند. ۶۹٪ (۱۱ مورد) از کل نوزادان مبتلا تشخیص و بقیه فوت شدند. بیشترین نشانه‌های بالینی منجر به بررسی نوزادان (شامل چند نشانه در یک نوزاد) خوب شیر نخوردن ۸۱٪ (۱۳ مورد) و سیس لتارژی ۳۷/۵٪ (۶ مورد) بود. سن نوزادان در زمان مراجعه، ۲-۲۴ روز با متوسط ۱۰/۸ روز بود. تمامی این نوزادان تحت درمان دارویی (تیامین، کاربینتین، فرمولای مخصوص) قرار گرفتند. جهت درمان ۱۱ نفر (۶۹٪) از این نوزادان که دچار علایم شدید بیماری (کوما، هایپوتونی شدید، اسیدوز متابولیک شدید) بودند، تعویض خون نیز انجام شد که ۳ نفر (۲۷٪) علی‌رغم تعویض خون فوت شدند و در ۸ نفر (۷۳٪) علائم کنترل و نوزادان تشخیص شدند.

### مواد و روشها

در این مطالعه توصیفی پرونده‌پژوهشی نوزادان مراجعه کننده با علایم بالینی مطرح کننده بیماری‌های سرنشی متابولیسم که بر اساس سطوح بالای اسیدهای آمینه شاخه دار با استفاده از آنالیز کمی اسیدهای آمینه سرم و/یا ادرار، از طریق تست کروماتوگرافی اسیدهای آمینه با بهره گیری از دستگاه-High performance liquid chromatography, HPLC) بیماری ادرار شربت افرا برای آنها داده شده بود، طی یک دوره زمانی ۱۰ ساله در بیمارستان کودکان امیرکلا، مورد بررسی قرار گرفت. در این نوزادان، سن، جنس، رابطه خوبی‌باشد والدین، محل سکونت والدین، نشانه‌های بالینی منجر به

جدول ۱. مشخصات بیماران مبتلا به بیماری ادرار شربت افرا در این مطالعه

سن (روز)	جنس	والدین منسوب	علایم/نشانه‌های اصلی	تعویض خون	پیامدهای بسترهای
۹	دختر	دارد	خوب شیر نخوردن، سیانوز	انجام شد	ترخیص
۲۴	دختر	دارد	خوب شیر نخوردن، لتاڑی	انجام نشد	ترخیص
۵	دختر	دارد	خوب شیر نخوردن	انجام شد	ترخیص
۸	دختر	دارد	خوب شیر نخوردن، لتاڑی	انجام شد	فوت
۱۰	دختر	دارد	خوب شیر نخوردن، بی قراری، دهیدراتاسیون	انجام شد	ترخیص
۶	دختر	دارد	خوب شیر نخوردن، استفراغ	انجام نشد	فوت
۲	دختر	ندارد	خوب شیر نخوردن	انجام نشد	ترخیص
۲۰	دختر	دارد	خوب شیر نخوردن، رنگ پریدگی، لتاڑی	انجام نشد	فوت
۸	دختر	دارد	خوب شیر نخوردن، هایپوتونی، ایکتر	انجام شد	ترخیص
۱۱	پسر	دارد	خوب شیر نخوردن، هایپوتونی، دهیدراتاسیون	انجام شد	فوت
۱۳	دختر	دارد	بی قراری، هایپرتونیستی	انجام نشد	ترخیص
۹	دختر	ندارد	خوب شیر نخوردن، تپ	انجام شد	فوت
۱۳	پسر	دارد	خوب شیر نخوردن، لتاڑی	انجام شد	ترخیص
۱۹	پسر	دارد	خوب شیر نخوردن، هایپوتونی	انجام شد	ترخیص
۱۰	پسر	دارد	لتارژی، کاهش رفلکس‌های نوزادی	انجام شد	ترخیص
۶	دختر	دارد	تب، اسهال	انجام شد	ترخیص



حالیکه Nyhan و همکاران در بررسی درمان حمله MSUD با توجه به اینکه اندازه گیری های مستقیم، برداشت مقادیر کمی از اسیدهای آمینه با این روش را مشخص کرده است، تعویض خون را در درمان حمله حاد MSUD توصیه نکردند (۷). Saudubray و همکاران با بررسی نتایج درمان ۱۶ نوزاد مبتلا، تعویض خون همراه با دیالیز صفاقی یا تعویض خون متعدد یا طولانی را بهترین روش برداشت توکسین ها در این بیماری دانستند (۸). با توجه به عدم دسترسی به دیالیز، در نوزادان با بیماری ادرار شربت افرای شدید و کوما در این مرکز از تعویض خون با دو برابر حجم خون در این موارد استفاده شد که ۳ مورد (۲۷٪) علی‌رغم تعویض خون فوت شدند و در ۸ مورد (۷۳٪) علائم کنترل و نوزادان MSUD ترخیص شدند. بر اساس مطالعات انجام شده غربالگری نوزادان برای امکان تشخیص زودرس و ایجاد سم زدایی معکوس طی ۴۸-۲۴ ساعت اول را فراهم می‌سازد و لذا نیاز به سم زدایی خارجی و خطر صدمه مغزی در این دوره آسیب پذیر را می‌کاهد. (۹). با در نظر گرفتن اهمیت تشخیص زودرس مبتلایان در پیش آگهی بیماری ادرار شربت افرا و فراوانی محاسبه شده که بیش از هفت برابر آمارهای جهانی است، استفاده از آزمونهای غربالگری برای نوزادان متولد شده در این منطقه و انجام آزمایشات تشخیصی پره ناتال برای خانواده های با سابقه فامیلی ابتلا به این بیماری، پیشنهاد می‌گردد.

## تقدیر و تشکر

بدین وسیله از خدمات آقای دکتر علی بیژنی در مشاوره آماری و خانم اعظم السادات مظلومی تشکر و قدردانی به عمل می‌آید.

## بحث و نتیجه گیری

در این مطالعه فراوانی ۵٪ برای بیماری ادرار شربت افرا در نوزادان بستری در بیمارستان کودکان امیرکلا مشخص شد. با وجود اینکه اولاً بروز بیماری ادرار شربت افرا محدود به دوره نوزادی نبوده و در این مطالعه فقط فرم کلاسیک (از میان پنج فرم بیماری) که در دوره نوزادی منجر به بروز علائم بالینی شده است، مورد بررسی قرار گرفت و ثانیاً مراجعه کنندگان به این مرکز شامل تمام نوزادان متولد شده در استان مازندران با علائم بالینی بیماریهای سرشنی متابولیسم نبوده اند، فراوانی به دست آمده در کل استان ۱ در ۲۶۷۱۴ مطالعه شد، که با توجه به مطالب ذکر شده، "حداقل" فراوانی بیماری در استان است. فراوانی بیماری ادرار شربت افرا در کل جهان حدود ۱ در ۱۸۵۰۰ تولید زنده است (۱۰). با توجه به میزان کلی ازدواج فامیلی (۲۸٪) و متوسط ضریب درون همسری (۱۸٪) در ایران (۶) که بالاتر از آمار های جهانی است، شیوع بیشتر بیماریهای با توارث اتوزومال مغلوب، مانند بیماری ادرار شربت افرا، مورد انتظار است. نتایج بررسی فراوانی بیماری ادرار شربت افرا در جوامع دیگر با ضریب درون همسری بالا نیز موید این نتیجه گیری است (۱۱ و ۱۲)، در این مطالعه نیز والدین ۸۷٪ مبتلایان، منسوب بودند.

علی‌رغم اینکه در درمان اورژانس نوزادان مبتلا به MSUD که سیستم عصبی به خطر افتاده است، تعویض خون همانند دیالیز صفاقی و خونی جزء درمانهای اصلی است (۵)، اما نتایج تحقیقات مختلف در این زمینه متفاوت است. Wendel و همکاران کاربرد تعویض خون را در فاز حاد MSUD در دو نوزاد بررسی کردند. آنان دریافتند در مقاطع زمانی مشابه تعویض خون، شاید به علت عدم وجود یک لایه اضافی (پریتوئن)، مؤثرتر از دیالیز صفاقی است (۱۶) در

## Prevalence of Maple Syrup Urine Disease in Amirkola Children's Hospital, Iran (2002-2012)

**Y. Zahed Pasha (MD)<sup>1\*</sup>, M. Ahmadpour-Kacho (MD)<sup>1</sup>, M. Alijanpour (MD)<sup>1</sup>,**  
**R. Behmadi (MD)<sup>2</sup>, T. Jahangir (BSc)<sup>2</sup>**

1. Non-Communicable Pediatric Diseases Research Center, Amirkola Children's Hospital, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran

2. Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran

---

**J Babol Univ Med Sci;16(3); Mar 2014; pp: 54-58**

**Received: Jul 27<sup>th</sup> 2013, Revised: Sep 4<sup>th</sup> 2013, Accepted: Nov 6<sup>th</sup> 2013.**

### **ABSTRACT**

**BACKGROUND AND OBJECTIVE:** Inborn errors of metabolism (IEM) are one of the differential diagnoses of neonates hospitalized with symptoms of neonatal sepsis. Maple syrup urine disease (MSUD) is a rare, autosomal recessive, inborn error of metabolism with high prevalence in populations with high inbreeding coefficient. In this study, the prevalence of this disease in newborns admitted to the Amirkola children's hospital in Mazandaran province in 2002-2012 has been investigated.

**METHODS:** In this descriptive study, records of neonates admitted with nonspecific symptoms of IEM were studied. Patients with diagnosis of MSUD according to elevated levels of branched-chain amino acids in quantitative analysis of serum and/or urine amino acids were investigated for age, sex, consanguinity and location of parents, clinical signs, type of treatment and outcomes for hospitalization.

**FINDINGS:** From 3154 neonates admitted to this hospital in this time period, 16 cases were diagnosed as MSUD (0.5%). According to the total number of births in the province during the study period (427420 people), prevalence of MSUD was 1 in 26,714 births in the whole province. Double volume exchange transfusion done in addition to drug treatment for 69% of cases (11 cases) which led to disease control and patient discharge in 73% of cases (8 cases).

**CONCLUSION:** The results of this study showed that maple syrup urine disease prevalence in the study area is high. Implementation of the screening program for MSUD in this area and prenatal tests for families of index cases are recommended.

---

**KEY WORDS:** *Neonates, Maple syrup urine disease, Exchange transfusion.*

---

### **Please cite this article as follows:**

Zahed Pasha Y, Ahmadpour-Kacho M, Alijanpour M, Behmadi R, Jahangir T. Prevalence of maple syrup urine disease in Amirkola children's hospital, Iran (2002-2012). J Babol Univ Med Sci 2014;16(3): 54-58.

---

\*Corresponding Author; **Y. Zahed Pasha (MD)**

**Address:** Non-Communicable Pediatric Diseases Research Center, Amirkola Children's Hospital, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran

**Tel:** + 98 111 3242151-5

**E-mail:** yzpasha@yahoo.com

## References

- 1.Sarafoglu K, Hoffman G, Roth K. Pediatric endocrinology and inborn errors of metabolism. 1st ed. New York: McGraw-Hill 2009; pp:69-72.
- 2.Mamer OA, Reimer ML. On the mechanisms of the formation of L-alloisoleucine and the 2-hydroxy-3-methylvaleric acid stereoisomers from L-isoleucine in maple syrup urine disease patients and in normal humans. *J Biol Chem* 1992; 267 (31): 22141-7.
- 3.Hilliges C, Awiszus D, Wendel U. Intellectual performance of children with maple syrup urine disease. *Eur J Pediatr* 1993;152(2):144-7.
- 4.Schulze A, Lindner M, Kohlmüller D, Olgemöller K, Mayatepek E, Hoffmann GF. Expanded newborn screening for inborn errors of metabolism by electrospray ionization-tandem mass spectrometry: results, outcome, and implications. *Pediatrics* 2003;111(6 Pt 1):1399-406.
- 5.Ogier de Baulny H. Management and emergency treatments of neonates with a suspicion of inborn errors of metabolism. *Semin Neonatol* 2002;7(1):17-26.
- 6.Saadat M, Ansari-Lari M, Farhud DD. Consanguineous marriage in Iran. *Ann Hum Biol* 2004;31(2):263-9.
- 7.McInnes RR, Williard HF. Genetics in medicine. 6th ed. London: Saunders Co 2004; pp: 9-57.
- 8.Bittles, Alan H. The role and significance of consanguinity as a demographic variable. *Popul Dev Rev* 1994;20 (3): 561-84.
- 9.Bickel H, Guthrie R, Hammersen G. Neonatal screening for inborn errors of metabolism, Berlin, Springer Verlag 1980; p:19.
- 10.Scriver CR, Beaudet AL, Sly WS, Valle D. The metabolic and molecular bases of inherited disease. 8th ed. New York: McGraw Hill 2001; p:1971.
- 11.Quental S, Vilarinho L, Martins E, et al. Incidence of maple syrup urine disease in Portugal. *Mol Genet Metab* 2010;100 (4):385-7.
- 12.Morton DH, Strauss KA, Robinson DL, Puffenberger EG, Kelley RI. Diagnosis and treatment of maple syrup disease: a study of 36 patients. *Pediatrics* 2002;109 (6):999-1008.
- 13.Applegarth DA, Toone JR, Lowry RB. Incidence of inborn errors of metabolism in British Columbia, 1969-1996. *Pediatrics* 2000;105(1):e10.
- 14.Thomas, Duncan C. Statistical methods in genetic epidemiology. 1st ed. New York: Oxford University Press 2004; pp: 61-95.
- 15.The National Organization for Civil Registration. Ministry of interior, Islamic Republic of Iran. Available from:<http://www.sabteahval.ir/Default.aspx?tabid=4762>. [in Persian]
- 16.Wendel U, Langenbeck U, Lombeck I, Bremer HJ. Exchange transfusion in acute episodes of maple syrup urine disease. Studies on branched-chain amino and keto acids. *Eur J Pediatr* 1982;138(4):293-6.
- 17.Nyhan WL, Rice-Kelts M, Klein J, Barshop BA. Treatment of the acute crisis in maple syrup urine disease. *Arch Pediatr Adolesc Med* 1998;152(6):593-8.
- 18.Saudubray JM, Ogier H, Charpentier C, et al. Hudson memorial lecture.Neonatal management of organic acidurias. Clinical update. *J Inherit Metab Dis* 1984;7(Suppl1):2-9.
- 19.Heldta K, Schwahna B, Marquardtb I, Grotzkea M, Wendela U. Diagnosis of MSUD by newborn screening allows early intervention without extraneous detoxification. *Mol Genet Metab* 2005;84(4):313-6.